

Methacholineprovocatietest

Inleiding

Uw behandelend arts heeft u voor een Methacholineprovocatietest naar de afdeling Functieonderzoek/ Longgeneeskunde verwezen. Dit onderzoek duurt ongeveer 60 minuten.

Waarom dit onderzoek?

Het kan zijn dat u in een bepaalde situatie of omgeving meer kortademig bent. Dit betekent dat uw luchtwegen onder invloed van prikkels van buitenaf sneller en heviger kunnen reageren dan normaal. Dit kan met dit onderzoek worden getest. De behandeling van de eventuele klachten kan hier dan zo goed mogelijk op aansluiten.

Vorbereidingen

Soms worden uw lengte en gewicht gemeten. Indien mogelijk schoenen aandoen die u makkelijk kunt uit- en aantrekken. Sommige longmedicijnen moeten voor het onderzoek gestopt worden. Dit staat onder aan de folder.

Wie doet het onderzoek?

Dit onderzoek wordt gedaan door een hiervoor opgeleide analist. De analist zal u regelmatig aansporen om het maximale resultaat te krijgen.

Hoe gaat het onderzoek?

Tijdens dit onderzoek ademt u aan een speciaal apparaat: een spirometer. Hieraan bevindt zich een mondstuk dat u in de mond neemt. Ook krijgt u een klemmetje op de neus zodat u alleen door de mond kunt ademen.

Om na te gaan hoe gevoelig uw luchtwegen zijn, gaat u Methacholine inhaleren. Door na elke concentratie uw longfunctie te meten, kan worden nagegaan of er een reactie is van de luchtwegen. Het kan zijn dat u zich wat kortademig gaat voelen of moet hoesten. Als er een bepaalde daling van de longfunctie is gemeten, krijgt u direct medicijnen waardoor de klachten snel verdwijnen.

Heeft u nog vragen?

Aarzel niet om ons te bellen. Wij helpen u graag verder. Bel (0182) 50 52 90.

Groene Hart Ziekenhuis, Locatie Gouda

Bleulandweg 10
2803 HH Gouda

Algemeen telefoonnummer ziekenhuis:
(0182) 50 50 50

Colofon

uitgave : Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
productie : Marketing & Communicatie
april 2025
04.13.080

Deze medicatie stoppen voor het onderzoek:

Naam op alfabet	uur
Acidinium	36
Acidinium / Formoterol	36
Aectura	48
Aerivo	36
Airbufo	36
AirFluSal	36
Airomir	8
Anoro	72
Atimos	36
Atrovent	12
Beclometason/ Formoterol	36
Beclometason/ Formoterol / Glycopyrronium	36
Berodual	12
Bevespi	36
Bricanyl	8
Budesonide/ Formoterol	36
Budesonide / Salmeterol	36
Bufoler	36
Busalair	36
Combivent	12
Duaklir	36
DuoResp	36
Eklira	36
Enerzair	48
Fenoterol / Ipratropium	12
Fluticason / Salmeterol	36
Fluticason/ Vilanterol/ Umeclidinium	36
Fluticason/ Vilanterol	48
Flutiform	36
Formoterol	36
Formoterol / Fluticason	36
Formoterol / Glycopyrronium / Budesonide	36
Foster	36
Glycopyrronium	72
Glycopyrronium/ Formoterol	36
Glycopyrronium/ Indacaterol	72
Hirobriz	48
Incruse	36
Indacaterol	48
Indacaterol / Glycopyrronium / Mometason	48

Indacaterol / Mometason	48
Ipratropium	12
Montelukast	36
Olodaterol	48
Onbrez	48
Oxis	36
Relvar	48
Roflumilast	48
Salbutamol	8
Salbutamol / Ipratropium	12
Salflutin	36
Salfuler	36
Salmeterol	36
Seebri	72
Seretide	36
Serevent	36
Singulair	36
Spiolto	72
Spiriva	72
Striverdi	48
Symbicort	36
Tavalus	72
Terbutaline	8
Tiotropium	72
Tiotropium / Olodaterol	72
Tiotrus	36
Tovanar	72
Trelegy	36
Trimbow	36
Trixeo	36
Ultibro	72
Umeclidinium	36
Umeclidinium / Vilanterol	72
Ventolin	8
Xoterna	36

Deze medicatie **NIET** stoppen:

Alvesco
Beclometason
Budesonide
Ciclesonide
Flixotide
Fluticason
Pulmicort
Qvar