

Dotteren van een shunt

Inleiding

U krijgt deze folder omdat uw shunt wordt gedotterd. Dit vindt plaats op de afdeling Radiologie met behulp van röntgenapparatuur en contrastvloeistof.

Doel van het dotteren

Door te dotteren wordt de vernauwing in uw shunt opgeheven.

Aanleiding voor het dotteren

Het dotteren van de shunt vindt meestal plaats na een gemaakte shuntfoto of duplexonderzoek waarop een vernauwing is waargenomen. Het kan ook zijn dat uw shunt naar aanleiding van waarnemingen van de dialysearts en/of verpleegkundige wordt gedotterd.

Belang van het dotteren

Wanneer een vernauwing van de shunt wordt opgeheven, neemt de kans op stolling van uw shunt af.

Vorbereiding

- Op de dag van het onderzoek neemt u een licht ontbijt in verband met kans op misselijkheid. Vindt de behandeling 's middags plaats dan mag u een gewoon ontbijt en een lichte lunch.
- U meldt zich altijd op de afdeling Dialyse. Vanaf hier wordt u naar de afdeling Radiologie begeleid.
- Als u bloedverdunners gebruikt kan extra bloedafname nodig zijn.
- De vernauwing in uw shunt wordt opgeheven door het opblazen van een ballonnetje. Dit kan pijnlijk zijn. De dialyseverpleegkundige geeft u pijnstillers

die u een uur voor de ingreep moet innemen.

Behandeling

De behandeling wordt uitgevoerd door een interventieradioloog en een radiologisch laborant(e) op de afdeling Radiologie. Om uw shunt te kunnen dotteren is het noodzakelijk dat de shunt eerst wordt afgebeeld. Deze foto's worden gemaakt via een plastic slangetje in de shunt tijdens inspuiten van contrastvloeistof. Dit kan een warm gevoel geven in het hele lichaam.

Let op:

Heeft u eerder contrastvloeistof ingespoten gekregen en is er toen een allergische reactie vastgesteld, vertel dit dan aan uw arts of verpleegkundige.

Als er besloten wordt om te dotteren wordt via de naald de dotterkatheter ingebracht. Het opblazen van de ballon kan gevoelig zijn. (zie voorbereiding).

Na het dotteren

Na het dotteren, komt u terug op de afdeling Dialyse voor het verwijderen van de naald of voor uw dialysebehandeling. Als u bloedverdunners gebruikt, zal dit weer worden hervat.

Het resultaat

Het resultaat van het dotteren hoort u van uw behandelend specialist. Om het resultaat te meten wordt indien mogelijk een week na de ingreep de stroomsnelheid van het bloed door de shunt gemeten tijdens de dialysebehandeling.

Vragen en inlichtingen

Voor algemene informatie over het ziekenhuis kunt u terecht op onze website: www.ghz.nl. Ook kunt u dagelijks bellen naar het algemene telefoonnummer: (0182) 50 50 50.

Heeft u na het lezen van deze folder vragen dan kunt u die stellen aan de radioloog en/of radiologisch laborant(e) die bij het onderzoek aanwezig zijn of aan de verpleegkundige van de afdeling Dialyse.

Ook kunt u bellen met de afdeling Dialyse via telefoonnummer: (0182) 50 54 22.

Groene Hart Ziekenhuis, Locatie Gouda

Bleulandweg 10
2803 HH Gouda

Algemeen telefoonnummer ziekenhuis:
(0182) 50 50 50.

Colofon

uitgave: Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
productie: Marketing & Communicatie
juni 2021
08.10.009