

Allopurinol

Inleiding

Uw behandelend arts en/of MDL-verpleegkundig specialist heeft met u gesproken over het gebruik van Allopurinol. In deze folder krijgt u informatie over de werking en het gebruik van Allopurinol. Ook leest u hoe u moet handelen in geval van bijwerkingen. Deze folder is echter géén vervanging van de bijsluiters. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u daarmee bij uw behandelend arts of verpleegkundige terecht.

Algemeen

De oorzaak van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa is niet bekend. Elke behandeling met medicijnen is gericht op het onderdrukken van ontstekingsreacties. Dit leidt vaak tot vermindering van klachten en verkleint de kans op complicaties die zich bij deze ziektes voor kunnen doen. Medicijnen kunnen de darmontstekingen onderdrukken, maar ze kunnen de ziekte niet definitief genezen. Na het afbouwen van of stoppen met medicijnen, kunnen de ontstekingen en daarmee de klachten weer terugkomen.

Werking

Uw behandelend arts heeft u eerder azathioprine (imuran) of 6-mercaptopurine (puri-nethol) voorgeschreven. Hierbij blijkt dat er bij u onvoldoende spiegel (6-TGN) van het medicijn kan worden opgebouwd, doordat dit in uw lichaam wordt omgezet in een afbraakproduct (6-MMP). Dit kan gecorrigeerd worden door toevoeging van het middel Allopurinol, een medicijn dat vooral bij de behandeling van jicht wordt toegepast.

Door gelijktijdig gebruik van azathioprine of 6-mercaptopurine en Allopurinol stijgt de spiegel en daalt het afbraakproduct. Doordat Allopurinol de afbraak van azathioprine of 6-mercaptopurine beïnvloedt, moet de dosis van deze middelen worden verlaagd. Ook moet het bloed in de eerste weken na toevoeging van Allopurinol extra gecontroleerd worden. Daarnaast kan Allopurinol bijwerkingen geven.

Bijwerkingen

- Vaak (1 tot 10%): allergische huidreacties zoals huiduitslag;
- Soms (0,1 tot 1%): maagdarfstoornissen zoals misselijkheid, braken (te verminderen door innamen na de maaltijd);
- Zelden (0,01 tot 0,01%): overgevoeligheidsreacties. Zie bijsluiters.

In verband met mogelijke bijwerkingen zal met enige regelmaat uw bloed worden gecontroleerd. Hierover licht de MDL-verpleegkundige of MDL-arts u in.

Gebruik

Allopurinol is een geneesmiddel in de vorm van tabletten. U neemt het tablet/de tabletten eenmaal per dag na de maaltijd in.

Vaccinaties

Door gelijktijdig gebruik van azathioprine/6-mercaptopurine en Allopurinol kan de werkzaamheid van sommige soorten vaccins verminderen en is de kans op bijwerkingen door de vaccins groter.

Vaccinatie met een verzwakt levend vaccin, zoals bof, mazelen, rode hond (BMR), gele koorts of BCG, moeten vermeden worden tijdens het gebruik van azathioprine/6-mercaptopurine en Allopurinol. Overleg met uw apotheker of arts als u moet worden gevaccineerd. Griepvaccinatie mag wel worden gebruikt bij Allopurinol.

Fertiliteit, zwangerschap en borstvoeding

Voor mannen

Voor zover nu bekend is, heeft gebruik van Allopurinol geen invloed op de vruchtbaarheid. Mannen met een kinderwens mogen allopurinol gebruiken.

Voor vrouwen

Voor zover nu bekend is, heeft Allopurinol geen invloed op de vruchtbaarheid. Het is erg belangrijk om uw behandelend arts te vertellen als u zwanger wilt worden of al zwanger bent. Het is niet bekend of Allopurinol veilig is voor het ongeboren kind. Daarom mag u tijdens een zwangerschap geen Allopurinol gebruiken. U mag Allopurinol ook niet gebruiken als u borstvoeding geeft. Allopurinol gaat over in de moedermelk.

Tot slot

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, neem dan contact op met uw verpleegkundige.

Contact

U kunt ons dagelijks bereiken voor vragen, voor advies bij klachten/bijwerkingen of als u zelf een afspraak wilt maken voor het verpleegkundig spreekuur.

We hebben telefonische spreekuur op

maandag, woensdag en donderdag

tussen 8.00 tot 9.00 uur. U kunt ons bereiken op telefoonnummer: (0182) 50 56 54.

U kunt ook mailen naar:

mdlverpleegkundige@ghz.nl.

Vermeld in uw e-mail uw patiëntnummer en/of geboortedatum.

Wij proberen uw e-mail binnen twee werkdagen te beantwoorden.

Bij klachten of dringende vragen die niet tot het telefonisch spreekuur kunnen

wachten, kunt u ons de hele werkdag op maandag tot en met donderdag (tussen 8.00 tot 16.30 uur) telefonisch bereiken. Op vrijdag of bij afwezigheid van de verpleegkundige kunt u telefonisch contact opnemen met de secretaresse van MDL-artsen, via telefoonnummer: (0182) 50 50 50.

Meer informatie

Op de volgende websites vindt u betrouwbare informatie over uw ziektebeeld:

- www.crohn-colitis.nl
- www.mlds.nl

Heeft u nog vragen?

Voor meer informatie over het Groene Hart Ziekenhuis kunt u terecht op onze website: www.ghz.nl.

Ook kunt u bellen naar het algemene nummer: (0182) 50 50 50.

Adres:

Groene Hart Ziekenhuis, locatie Gouda
Bleulandweg 10
2803 HH Gouda

Colofon

uitgave: Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
productie: Marketing & Communicatie
december 2021
05.12.019