

### Allopurinol

#### Inleiding

Uw behandelend arts en/of MDL-verpleegkundig specialist heeft met u gesproken over het gebruik van Allopurinol. In deze folder krijgt u informatie over de werking en het gebruik van Allopurinol. Ook leest u hoe u moet handelen in geval van bijwerkingen. Deze folder is echter géén vervanging van de bijsluiter. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u daarmee bij uw behandelend arts of verpleegkundige terecht.

#### Algemeen

De oorzaak van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa is niet bekend. Elke behandeling met medicijnen is gericht op het onderdrukken van ontstekingsreacties. Dit leidt vaak tot vermindering van klachten en verkleint de kans op complicaties die zich bij deze ziektes voor kunnen doen. Medicijnen kunnen de darmontstekingen onderdrukken, maar ze kunnen de ziekte niet definitief genezen. Na het afbouwen van of stoppen met medicijnen, kunnen de ontstekingen en daarmee de klachten weer terugkomen.

#### Werking

Uw behandelend arts heeft u eerder azathioprine (imuran) of 6-mercaptopurine (puri-nethol) voorgeschreven. Deze medicamenten worden in het lichaam omgezet in een werkzame stof en een bijproduct. Bij u blijkt dat er teveel van het bijproduct gemaakt wordt en te weinig van de werkzame stof is. Dit maakt dat het medicijn enerzijds onvoldoende werkt en anderzijds zelfs kan leiden tot bijwerkingen. De omzetting kan gecorrigeerd worden door toevoeging van het middel

allopurinol, een medicijn wat vooral bij de behandeling van jicht wordt toegepast. Door toevoeging van allopurinol wordt er meer werkzame stof gemaakt en minder bijproduct. Het is daarom belangrijk dat de dosering van de azathioprine of 6-mercaptopurine verlaagd wordt tijdens het gebruik van allopurinol. Tevens dient net als bij het starten van azathioprine/6-Mercaptopurine het bloed na toevoeging van allopurinol in de eerste weken extra gecontroleerd te worden.

#### Bijwerkingen

Bijwerkingen komen weinig voor bij gebruik van allopurinol.

Allergische huidreacties, zoals huiduitslag, worden het meest beschreven. Daarnaast kunnen in zeldzame gevallen misselijkheid en braken optreden. Uiteraard blijven de mogelijke bijwerkingen van azathioprine of 6-Mercaptopurine onverminderd gelden wanneer u daarnaast allopurinol gebruikt.

#### Gebruik

Allopurinol is een geneesmiddel in de vorm van tabletten. U neemt het tablet/de tabletten eenmaal per dag tijdens of vlak na het eten in. U mag de tablet/tabletten innemen met een glas water.

#### Vaccinaties

Door gelijktijdig gebruik van azathioprine/6-mercaptopurine en Allopurinol kan de werkzaamheid van sommige soorten vaccins verminderen en is de kans op bijwerkingen door de vaccins groter.

Vaccinatie met een verzwakt levend vaccin, zoals bof, mazelen, rode hond (BMR), gele koorts of BCG, moeten

vermeden worden tijdens het gebruik van azathioprine/6-mercaptopurine en Allopurinol. Overleg met uw apotheker of arts als u moet worden gevaccineerd. Griepvaccinatie mag wel worden gebruikt bij Allopurinol.

### **Fertiliteit, zwangerschap en borstvoeding**

#### *Voor mannen*

Voor zover nu bekend is, heeft gebruik van Allopurinol geen invloed op de vruchtbaarheid. Mannen met een kinderwens mogen allopurinol gebruiken.

#### *Voor vrouwen*

Voor zover nu bekend is, heeft Allopurinol geen invloed op de vruchtbaarheid. Het is erg belangrijk om uw behandelend arts te vertellen als u zwanger wilt worden of al zwanger bent. Het is niet bekend of Allopurinol veilig is voor het ongeboren kind. Daarom mag u tijdens een zwangerschap geen Allopurinol gebruiken. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Dit medicijn komt in de moedermelk terecht. Het is niet bekend of dit slecht is voor de baby.

### **Tot slot**

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, neem dan contact op met uw verpleegkundige.

### **Contact**

U kunt ons bereiken voor vragen, voor advies bij klachten/bijwerkingen of als u zelf een afspraak wilt maken voor het verpleegkundig spreekuur.

We hebben telefonische spreekuur op

**maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tussen 8.00 tot 9.00 uur.** U kunt ons bereiken op telefoonnummer: (0182) 50 56 54.

U kunt ook mailen naar:

mdlverpleegkundige@ghz.nl.

Vermeld in uw e-mail uw patiëntnummer en/of geboortedatum.

Wij proberen uw e-mail binnen twee werkdagen te beantwoorden.

Bij klachten of dringende vragen die niet tot het telefonisch spreekuur kunnen

wachten, kunt u de secretaresse bereiken tussen 9.00 – 11.00 uur en 14.00 – 16.00 uur op telefoonnummer 0182 – 50 50 05.

### **Meer informatie**

Op de volgende websites vindt u betrouwbare informatie over uw ziektebeeld:

- [www.crohn-colitis.nl](http://www.crohn-colitis.nl)
- [www.mlds.nl](http://www.mlds.nl)

### **Heeft u nog vragen?**

Voor meer informatie over het Groene Hart Ziekenhuis kunt u terecht op onze website: [www.ghz.nl](http://www.ghz.nl).

Ook kunt u bellen naar het algemene nummer: (0182) 50 50 50.

### **Adres:**

Groene Hart Ziekenhuis, locatie Gouda  
Bleulandweg 10  
2803 HH Gouda

### **Colofon**

uitgave: Groene Hart Ziekenhuis, Gouda  
productie: Marketing & Communicatie  
december 2025  
05.12.019