

### Allergie huidpriktest

U hebt zojuist een afspraak gekregen voor een allergie huidpriktest. In deze folder vindt u informatie over dit onderzoek en belangrijke zaken die u vooraf moet weten.

#### De huidpriktest

De allergietest wordt uitgevoerd met een huidtest. Hiervoor worden oplossingen gebruikt waarin stoffen zitten uit de natuurlijke omgeving, zoals gras-en boompollen. Van de verschillende oplossingen wordt een druppel op uw onderarm aangebracht. Door de druppel heen wordt met een klein naaldje door de bovenste laag van de huid geprikt. Dit is licht voelbaar, maar een speldenprik is vervelender.



Na een kwartier kan worden afgelezen of u allergisch reageert. Er zal dan een bultje op uw onderarm verschijnen dat een beetje kan jeuken. Het totale allergieonderzoek duurt 20 tot 30 minuten en wordt uitgevoerd door een polikliniekassistente.

#### De uitslag

Op basis van de uitslag van de huidpriktest én uw klachten zal bekeken worden of de huidige behandeling van de allergie moet worden aangepast. U krijgt een vervolgspraak met de KNO-arts om dit te bespreken.

#### Wanneer kan de huidpriktest niet uitgevoerd worden?

In sommige situaties kan de huidpriktest niet uitgevoerd worden. Wij verzoeken u, als een van de onderstaande punten voor u van toepassing is, contact op te nemen met de polikliniek KNO:

- Overgevoeligheid voor fenol en glycerol, de oplosstof van de allergenen.
- Als uw huid sterk reageert op geringe mechanische prikkels.
- Zwangerschap (bij voorkeur de test uitstellen tot na de bevalling).
- Verhoogd infectierisico, in verband met de kans op besmetting.
- Huidaandoeningen op beide onderarmen (dermatitis, eczeem).
- Ziekten die uw algehele conditie ernstig beïnvloeden.

#### Stoppen medicatie voor het onderzoek

Sommige medicijnen hebben invloed op de uitslag van het onderzoek. Op de achterkant van deze folder staat precies om welke medicijnen het gaat.

- *Antihistaminica / anti allergie tabletjes:* stopt u met het gebruik van deze medicatie 72 uur vóór het onderzoek. Als u twijfelt of u kunt stoppen, overlegt u dan met uw voorschrijvend arts.
- *Ontstekingsremmende medicijnen:* deze medicijnen moeten 72 uur voorafgaand aan het onderzoek gestopt worden. Overleg met uw voorschrijvend arts of dit in uw geval mogelijk is. Als u niet kunt stoppen, neemt u dan contact op met de polikliniek KNO om een alternatief onderzoek te bespreken.
- *Antidepressiva:* deze medicijnen kunnen niet zomaar gestopt worden. Neemt u contact op met de poli KNO om een alternatief onderzoek te bespreken.

Lokale medicijnen zoals neussprays en oogdruppels hebben geen invloed op het onderzoek en hoeven dus niet gestopt te worden.

Als u vragen heeft over het stoppen van de medicijnen, neem dan contact op met de polikliniek KNO.

### **Invullen anamneseformulier**

Bij deze informatiefolder heeft u ook een anamneseformulier gekregen. Wij vragen u om dit formulier voorafgaand aan het onderzoek in te vullen en mee te nemen naar

de polikliniek.

### **Vragen?**

U kunt bellen naar het telefonisch spreekuur van de KNO, op maandag t/m vrijdag van 9.00 -11.00 en van 13.30 -15.30 uur, via tel.: (0182) 50 53 24. De polikliniekassistente staat u graag te woord.

### **Colofon**

uitgave: Groene Hart Ziekenhuis, Gouda  
productie: Marketing & Communicatie  
januari 2020  
04.08.063

Lijst met medicijnen die invloed hebben op de uitslag van het onderzoek:

<b>Antihistaminica</b> (middelen tegen allergie of andere aandoening) <i>Merknaam (stofnaam)</i>	<b>Orale corticosteroiden</b> (ontstekingsremmende middelen) <i>Merknaam (stofnaam)</i>
Aerius (desloratadine) Allerfree (loratadine) Atarax (hydroxyzine) Cinnipirine (cinnarizine) Cinnarizine (cinnarizine) Claritine (loratadine) Cyclizine (cyclizine) Dramamine (dimenhydrinaat) Emesafene (meclozine/pyridoxine) Hydroxyzine (hydroxyzine) Incidal (mehydroline) Fenistil (dimetindeen) Kestine (ebastine) Ketotifen (ketotifen) Marzine (cyclizine) Mebhydroline (mehydroline) Mizollen (mizolastine) Navicalm (hydroxyzine) Periactin (cyproheptadine) Phenergan (promethazine) Polaramine (dexchlorfeniramine) Promethazine (promethazine) Reactine (cetirizine) Semprex (acrivastine) Suprimal (meclozine) Tavegil (clemastine) Telfast (fexofenadine) Tinset (oxatomide) Triludan/Triludan Forte (terfenadine) Xyzal (levocetirizine) Zaditen (ketotifen) Zyrtec (cetirizine)	Albicort (triamcinolonacetonide) Celestone (betamethason) Cortison (cortison) Decadron (dexamethason) Depo-Medrol (betamethason) Dexamethason (dexamethason) Di-Adreson (prednisolon) Hydro-Adreson (hydrocortison) Hydrocortison (hydrocortison) Ledercort (triamcinolon) Lederspan (triamcinolonhexacetonide) Methylprednisolon (methylprednisolon) Methylpresol (methylprednisolon) Oradexon (dexamethason) Prednisolon (prednisolon) Prednison (prednison) Solu-Cortef (hydrocortison) Solu-Medrol (methylprednisolon) Triamcinolon (triamcinolon)
	<b>Tricyclische antidepressiva</b> <i>Merknaam (stofnaam)</i> Amitriptyline (amitriptyline) Anafranil (clomipramine) Ludiomil (maprotiline) Maprotiline (maprotiline) Nortilen (nortriptyline) Pertofran (desipramine) Prothiaden (dosulepine) Sarotex (amitriptyline) Sinequan (doxepine) Surmontil (trimipramine) Tryptizol (amitriptyline)