

Allergie huidpriktest

U heeft een afspraak voor een allergie huidpriktest. In deze folder leest u wat dit voor test is en wat u voor de test moet weten.

Belangrijke punten:

- De test duurt 20 tot 30 minuten.
- We doen druppels op uw arm en prikken hier doorheen.
- Na 15 minuten kijken we of u ergens allergisch voor bent.
- Gebruik geen anti-allergiemedicijnen 72 uur voor de test.
- Vul het anamneseformulier in en neem het mee naar de afspraak. Dit is een vragenlijst over uw gezondheid.
- Vragen? Bel 0182 – 50 53 24.

Wat is een huidpriktest?

Voor de test gebruiken wij vloeistoffen waarin stoffen zitten uit de natuur, zoals gras- of boompollen. Zo gaat de test:

- U krijgt druppels van de testvloeistoffen op uw onderarm.
- Door elke druppel prikken we met een klein naaldje in uw huid.
- U kan een klein prikje voelen. Dit doet geen pijn.
- Na 15 minuten kijken we of u allergisch reageert. Er ontstaat dan een bultje op de onderarm dat een beetje kan jeuken.
- De test duurt in totaal 20 tot 30 minuten.



Na de test

We bekijken de uitslag van de huidtest samen met uw klachten. De arts beslist daarna of uw behandeling moet veranderen. U krijgt hiervoor een vervolgspraak met de arts.

Wanneer kunnen wij de test niet doen?

Soms kunnen wij de huidpriktest niet doen. Heeft u een van onderstaande klachten? Neem dan contact op met de poli KNO.

- U bent overgevoelig voor fenol of glycerol (de stoffen in de testvloeistof);
- U heeft een erg gevoelige huid die snel reageert op aanraking;
- U bent zwanger (we doen de test dan liever ná de bevalling);
- U heeft een verhoogd risico op infecties (besmetting);
- U heeft huidproblemen aan beide onderarmen, zoals eczeem of dermatitis;
- U heeft een ziekte die uw conditie erg verslechtert.

Medicijngebruik

Sommige medicijnen bepalen de uitslag van de test. Op de lijst met medicijnen ziet u met welke medicatie u moet stoppen.

Twijfelt u? Overleg dan met de arts die deze medicijnen heeft gegeven.

- Antihistaminica (anti-allergiemedicatie): stop minimaal 72 uur voor de test.
- Corticosteroiden (ontstekingsremmers): stop ook hiermee 72 uur voor de test. Kunt u niet stoppen? Bel dan met de poli KNO om te kijken of een andere test kan.
- Antidepressiva: deze medicijnen kunt u niet zomaar stoppen. Bel met de poli

KNO om een ander onderzoek te bespreken.

Advies

- Gebruik op de dag van de test geen bodylotion of andere crèmes op uw onderarmen. Dit kan de testuitslag beïnvloeden.

Vragenformulier

Bij deze folder heeft u ook een vragenformulier (anamneseformulier) gekregen. Dit is een formulier over uw algemene gezondheid, medicijngebruik, ziektes en allergieën. Vul dit formulier in en neem het mee naar de afspraak op de poli.

Heeft u nog vragen?

Misschien vindt u het antwoord op www.ghz.nl/veelgestelde-vragen. Klik daarna in het overzicht op 'KNO'. Komt u er dan niet uit? Neem dan contact met ons op. Bel op werkdagen tussen 9.30 – 11.00 uur en 14.00 – 15.30 uur met de polikliniek KNO via 0182 - 50 53 24.

Groene Hart Ziekenhuis, Locatie Gouda

Bleulandweg 10
2803 HH Gouda
0182-50 50 50
www.ghz.nl

Colofon

uitgave: Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
productie: Marketing & Communicatie
oktober 2025
04.08.063

Lijst met medicijnen die invloed hebben op de uitslag van het onderzoek:

Antihistaminica (middelen tegen allergie of andere aandoening) <i>Merknaam (stofnaam)</i>	Orale corticosteroïden (ontstekingsremmende middelen) <i>Merknaam (stofnaam)</i>
Aerius (desloratadine) Allerfre (loratadine) Atarax (hydroxyzine) Claritine (loratadine) Cyclizine (cyclizine) Emesafene (meclozine/pyridoxine), Fenistil (dimetindeen) Kestine (ebastine) Ketotifen (ketotifen) Mebhydroline (mebhydroline) Mizollen (mizolastine) Navicalm (hydroxyzine) Phenergan (promethazine) Polaramine (dexchlorfeniramine) Primatour (cinnarizine) Rupafin (rupatadine) Semprex (acrivastine) Suprimal (meclozine) Tavegil (clemastine) Telfast (fexofenadine) Tinset (oxatomide) Triludan/Triludan Forte (terfenadine) Xyzal (levocetirizine) Zaditen (ketotifen) Zyrtec (cetirizine)	Albicort (triamcinolonacetonide) Celestone (betamethason) Cortison (cortison) Decadron (dexamethason) Depo-Medrol (betamethason) Dexamethason (dexamethason) Di-Adreson (prednisolon) Hydro-Adreson (hydrocortison) Hydrocortison (hydrocortison) Ledercort (triamcinolon) Lederspan (triamcinolonhexacetonide) Methylprednisolon (methylprednisolon) Methylpresol (methylprednisolon) Oradexon (dexamethason) Prednisolon (prednisolon) Prednison (prednison) Solu-Cortef (hydrocortison) Solu-Medrol (methylprednisolon) Triamcinolon (triamcinolon)
Antihistaminica neussprays & oogdruppels <i>Merknaam (stofnaam)</i>	Tricyclische antidepressiva <i>Merknaam (stofnaam)</i>
Azelastine Dymista (Azelastine/ fluticason) Livocab (Levocabastine) Opatanol (Olopatadine) Ryaltris (Olopatadine) Zaditen (Ketotifen)	Amitriptyline (amitriptyline) Anafranil (clomipramine) Ludiomil (maprotiline) Maprotiline (maprotiline) Nortilen (nortriptyline) Pertofran (desipramine) Prothiaden (dosulepine) Sarotex (amitriptyline) Sinequan (doxepine) Surmontil (trimipramine) Tryptizol (amitriptyline)