

## Flecainide-Ajmaline provocatietest

### Inleiding

De cardioloog heeft in overleg met u een Flecainide-Ajmaline provocatietest afgesproken en heeft u al informatie gegeven over de reden van het onderzoek. In deze folder leggen we u uit hoe het onderzoek verloopt en wat u kunt verwachten.

### Doel van het onderzoek

De Flecainide-Ajmaline provocatietest is een onderzoek waarbij door middel van het toedienen van Flecainide-Ajmaline en tegelijkertijd observeren van het ECG (hartfilmpje), een eventueel bestaand Brugadasyndroom kan worden vastgesteld. Het Brugadasyndroom is een erfelijke aandoening waarbij de elektrische activiteit van het hart verstoord is. Deze verstoorde elektrische activiteit kan leiden tot (ernstige) hartritme stoornissen met symptomen zoals hartkloppingen, flauwvallen en soms plotseling overlijden. Het hart zelf vertoont een normale structuur, maar op een ECG is deze aandoening over het algemeen duidelijk te herkennen. Soms zijn er medicijnen (bijvoorbeeld Flecainide-Ajmaline) nodig om de aandoening op het ECG zichtbaar te maken.

### Voorbereiding

- U mag thuis op de dag van opname een licht ontbijt gebruiken (beschuit met jam en kopje thee). Echter, zes uur van te voren dient u nuchter te zijn. Dit houdt in dat u vanaf dat moment niet mag eten, drinken en roken.
- U mag uw medicijnen die u 's ochtends gebruikt innemen, tenzij de arts iets anders met u heeft afgesproken.

- U mag een begeleider meenemen naar het ziekenhuis. Vanaf een half uur voor het onderzoek en tijdens het onderzoek mag er echter niemand bij u blijven.

### Het onderzoek

Het onderzoek vindt plaats op afdeling Hartbewaking waar u door een verpleegkundige wordt opgenomen. De verpleegkundige zal een aantal dingen met u bespreken; er zal u o.a. gevraagd worden naar een contactpersoon. U wordt aangesloten aan een monitor die uw hartritme registreert. U krijgt een infuusnaald waardoor de medicijnen kunnen worden toegediend. Voor, tijdens en na het toedienen van de medicijnen, zal er regelmatig een hartfilmpje worden gemaakt en uw bloeddruk worden gemeten.

Geeft u direct aan wanneer u tijdens het toedienen van de medicijnen klachten krijgt zoals: hoofdpijn, duizeligheid, hartkloppingen, misselijkheid en braken, dubbelzien, tremoren (voortdurende schudbeweging van één of meer lichaamsdelen die wordt veroorzaakt door een onwillekeurige samentrekking van spieren), tintelingen en gevoel van opvliegers. Het toedienen van medicijnen kan dan vroegtijdig gestopt worden. Ook bij veranderingen van het hartfilmpje kan het nodig zijn om het toedienen van de medicijnen vroegtijdig te stoppen.

### Na het onderzoek

- Wanneer er geen veranderingen op het hartfilmpje zijn, blijft u nog enkele uren (meestal drie) op de afdeling ter observatie.

- Wanneer er wel afwijkingen op het hartfilmpje zijn, zal de cardioloog beslissen of u langer moet blijven (24 uur ter observatie).
- Bij ontslag is het toegestaan om zelf auto te rijden.

**Groene Hart Ziekenhuis, Locatie Gouda**

Bleulandweg 10  
2803 HH Gouda

Algemeen telefoonnummer ziekenhuis:  
(0182) 50 50 50

**Colofon**

uitgave : Groene Hart Ziekenhuis, Gouda  
productie : Marketing & Communicatie  
maart 2022  
04.03.031