

Flecaïnide provocatietest

De cardioloog heeft in overleg met u afgesproken dat u een Flecaïnide provocatietest krijgt. De cardioloog heeft u al uitgelegd waarom dit onderzoek nodig is. In deze folder leest u hoe het onderzoek verloopt en wat u kunt verwachten.

Belangrijke punten:

- U krijgt een test voor uw hart.
- De arts kijkt of u een speciale hartziekte heeft.
- U mag 6 uur voor de test niet meer eten.
- U mag tot 2 uur voor de test alleen nog water drinken.
- Neem uw medicijnen in volgens advies van de dokter.
- U krijgt de flecaïnide via een infuus.
- Vertel het als u zich niet goed voelt.
- Na de test blijft u nog 4 uur in het ziekenhuis.
- U mag zelf naar huis rijden na de test.
- Vragen? Bel 0182 – 50 50 50.

Doel van het onderzoek

Bij de provocatietest wordt met medicijnen en een hartfilmpje (ECG) onderzocht of u het Brugadasyndroom heeft. Het Brugadasyndroom is een erfelijke aandoening waarbij de elektrische activiteit van het hart verstoord is. Hierdoor kunnen (ernstige) hartritmestoornissen ontstaan. Symptomen kunnen zijn:

- hartkloppingen;
 - flauwvallen;
 - in zeldzame gevallen plotseling overlijden.
- Door het toedienen van het medicijn Flecaïnide kan het Brugadasyndroom worden aangetoond.

Vorbereiding

Niet eten en drinken:

- Tot 6 uur voor het tijdstip dat u zich in het ziekenhuis moet melden: u mag nog eten en drinken.
- Vanaf 6 uur tot 2 uur voor het tijdstip dat u zich in het ziekenhuis moet melden: u mag alléén nog water, thee, appelsap of aanmaaklimonade drinken.
- Slokjes water mogen tot aan de ingreep bijvoorbeeld bij dorst of medicijnen in nemen.



- Medicijnen: U mag uw medicijnen 's ochtends innemen. Volg altijd het advies van uw arts op.
- Begeleiding: U mag iemand meenemen naar het ziekenhuis. Tijdens het onderzoek en vanaf een half uur daarvoor mag deze persoon echter niet bij u blijven.

Het onderzoek

Op de dag van het onderzoek meldt u zich bij de receptie van de hoofdingang. Een medewerker brengt u naar de afdeling Hartbewaking (CCU A2).

U wordt aangesloten op een monitor voor een hartfilmpje. De monitor laat de activiteit van uw hart zien. De verpleegkundige brengt een infuusnaald in. Via dit infuus krijgt u de medicijnen. Voor, tijdens en na het geven van de medicijnen maken we regelmatig hartfilmpjes en meten we uw bloeddruk.

Krijgt u klachten? Geef dit dan gelijk door aan de verpleegkundige. Klachten kunnen zijn:

- hoofdpijn;
- duizeligheid;
- hartkloppingen;
- misselijkheid of braken;
- dubbelzien;
- tremoren (onwillekeurige schudbewegingen van spieren);
- tintelingen;
- het gevoel dat u opvliegers heeft.

Bij klachten of veranderingen op het hartfilmpje kunnen we het geven van de medicijnen eerder stoppen.

Na het onderzoek

- Geen veranderingen op het hartfilmpje:
U blijft nog enkele uren (4 uur) ter observatie op de afdeling.
- Wel veranderingen op het hartfilmpje:
De cardioloog beslist of u langer moet blijven, bijvoorbeeld 24 uur ter observatie.

U mag zelf naar huis rijden.

Heeft u nog vragen?

Bel op werkdagen tussen 8.30 uur en 16.30 uur met de polikliniek Cardiologie via 0182- 50 50 50 of 0182- 50 50 10.

Groene Hart Ziekenhuis, Locatie Gouda

Bleulandweg 10
2803 HH Gouda
0182- 50 50 50
www.ghz.nl

Colofon

uitgave : Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
productie : Marketing & Communicatie
september 2025
04.03.031