

Plastische Chirurgie

Weefselexpansie

Inleiding

Deze folder geeft u informatie over weefselexpansie. Bij weefselexpansie wordt een gedeelte van de huid opgerekt. Dit gebeurt met behulp van een opblaasbare ballon.

Realiseert u zich dat uw persoonlijke situatie anders kan zijn dan hier beschreven wordt. Deze folder geeft een algemeen overzicht en is dus niet volledig. Ook komt deze folder niet in de plaats van een gesprek met uw arts. De arts is altijd bereid om u een en ander uit te leggen en op uw vragen in te gaan.

Weefselexpansie

Weefselexpansie kan op bijna elke plaats van het lichaam worden toegepast. Met een operatie wordt een ballon onder de huid geplaatst. De opgerekte huid wordt gebruikt als bedekking van beschadigde huid, bijvoorbeeld een litteken, gezwel of brandwond. De opgerekte huid kan ook gebruikt worden bij het maken van een nieuwe borst.

Voor weefselexpansie zijn 2 operaties nodig.

Voor de operatie

Voor beide operaties geldt dat u voorafgaand aan de operatie geen bloedverdunners mag gebruiken in overleg met uw arts.

De operaties

Tijdens de eerste operatie wordt de lege ballon met een slangetje en ventiel onder de huid aangebracht, vlak naast de beschadigde huid. Dit gebeurt via een snee in de huid. Het vullen van de ballon gebeurt op de polikliniek, als de wond genezen is. Dit neemt een aantal weken in beslag. De plastisch chirurg spuit via het ventieltje, een

vloeistof in de ballon. De ballon zet uit en rekt de gezonde huid mee. Hierdoor ontstaat na elke inspuiting een zwelling. Dit geeft een gespannen gevoel. Dit gevoel kan op den duur storend of hinderlijk zijn, maar is niet te voorkomen. Als de huid voldoende is opgerekt wordt de tweede operatie gepland. Tijdens deze operatie wordt de ballon verwijderd en kan de opgerekte huid gebruikt worden.

Beide operaties vinden plaats onder narcose.

Na de operatie

Voor beide operaties geldt: als u bloedverdunnende medicatie gebruikt mag u daar de dag na de operatie weer mee beginnen.

Het herstel van de tweede operatie is afhankelijk van de plaats waar de huid is opgerekt. De plastisch chirurg zal het herstel met u bespreken.

Controle

Na de operatie komt u terug op de polikliniek voor controle. Zo nodig worden de hechtingen verwijderd. U krijgt hiervoor een afspraak mee.

Littekens

Bij elke operatieve behandeling ontstaan blijvende littekens. Op den duur zullen deze minder opvallend worden, maar een enkele keer blijft een litteken wel goed zichtbaar.

Na een operatie kunt u doorgaans wat last hebben van pijn en ongemak in het operatiegebied en littekens kunnen langere tijd dik, rood, jeukend en zelfs pijnlijk zijn. Sommige littekens worden op den duur breder dan men had verwacht en soms blijft

de huid in het littekengebied verkleurd. Bepaalde huidgebieden kunnen overgevoelig worden of juist een doof gevoel houden.

Risico's

Operatieve behandeling worden met de grootste zorg uitgevoerd. Toch kan het eindresultaat anders uitvallen dan verwacht. Aan de ene kant kan de verwachting te hoog gespannen zijn geweest, aan de andere kant bestaat een kleine kans op ongewenste complicaties. Garantie op de resultaten of op een ongestoord beloop (zonder complicaties) kunnen wij daarom niet geven. In principe is de kans op complicaties klein. In een klein percentage kan toch een complicatie optreden. Zoals: narcoseproblemen, trombosebeen, wondinfectie, bloeduitstorting of een doof gevoel in de huid.

In een enkel geval kan de opgespoten ballon leeglopen. Dit gebeurt als het slangetje en/of het ventiel niet goed functioneert. Ook kan de ballon zelf gaan lekken. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat het weefsel afsterft en de ballon naar buiten komt. Soms blijkt tijdens de tweede operatie dat de opgerekte huid onvoldoende is. In al deze gevallen moet er een nieuwe ballon ingebracht worden.

Eindresultaat

Het is belangrijk voor ons om te weten welke verwachting u hebt van de operatie. Wij adviseren u dan ook om ons zoveel mogelijk op de hoogte te stellen van bepaalde wensen.

Absolute symmetrie bij dubbelzijdige operaties (dus dat beide kanten er hetzelfde uitzien) is niet te garanderen.

Soms is het noodzakelijk om een aanvullende operatie uit te voeren voor een goed eindresultaat. Deze aanvullende operatie kan extra kosten met zich meebrengen. Deze kosten worden door uw zorgverzekeraar vergoed of komen voor uw eigen rekening.

Vergoeding

Operaties op medische indicatie worden vrijwel altijd vergoed door de verzekering. Cosmetische operaties worden vrijwel nooit vergoed door de verzekering. U betaalt de ingreep dan dus (in principe) zelf en u ontvangt een schriftelijke offerte van de kosten.

Contact opnemen

Als zich thuis complicaties voordoen, kunt u contact opnemen met uw behandelend specialist. Belt hiervoor de polikliniek assistent Plastische Chirurgie, telefoon: (0182) 50 58 78 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur).

Buiten de openingstijden van de polikliniek en bij acute problemen kunt u ook bellen met de Spoedeisende Hulp, via tel.: (0182) 50 53 27.

Algemene informatie over het GHZ

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u terecht op onze website: www.ghz.nl. Ook kunt u bellen naar het algemene informatienummer (0182) 50 50 50.

Vragen?

In deze folder hebben wij u informatie gegeven over weefselexpansie. Misschien hebt u na het lezen van deze folder vragen die niet kunnen wachten tot de dag van operatie. U kunt uw vragen stellen aan een medewerker van de polikliniek Plastische Chirurgie, via telefoon: (0182) 50 58 78. We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur.

Colofon

uitgave : Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
productie : Marketing & Communicatie
september 2019
04.04.040