

### Provocatietest antibiotica

#### Inleiding

Uw kind heeft mogelijk een allergie voor een of meerdere soorten antibioticum. Om te kunnen achterhalen of uw kind hier inderdaad allergisch voor is, zal er een antibioticumprovocatietest worden gedaan. Deze test houdt in dat uw kind in oplopende dosering een antibioticum-drankje krijgt. Zo kunnen we kijken of uw kind er allergisch op reageert.

#### Waarom in het ziekenhuis?

De test wordt in het ziekenhuis gedaan, omdat er een kleine kans bestaat dat uw kind heftig reageert op nieuw contact met het betreffende antibioticum.

De reactie op de test kan anders zijn dan reacties die eerder optraden. (Eventuele) heftige reacties treden altijd kort na het innemen op; binnen een uur. Daarom is het voor de veiligheid van uw kind verstandig om de test uit te voeren als er een arts in de buurt is. Indien nodig kan een arts medicijnen geven om de allergische reactie te onderdrukken. Ook in een later stadium kunnen allergische reacties optreden. Omdat deze reacties minder heftig zullen zijn, is de aanwezigheid van een arts in de directe omgeving niet nodig.

#### De test

Uw kind krijgt in drie stappen een oplopende dosis antibioticum toegediend. De eerste stap is één honderdste deel van de dosis die uw kind normaal zou moeten krijgen. Na zestig minuten krijgt uw kind één tiende deel van de dosis die uw kind normaal zou moeten krijgen. Na nogmaals zestig minuten krijgt uw kind de dosis die uw kind normaal zou moeten krijgen.

Hierna blijft uw kind nog twee uur op de afdeling ter observatie.

Als er geen reactie volgt mag uw kind samen met u naar huis. Thuis maakt u de antibioticumkuur verder af; hiervoor zijn twee dagen nodig. Het recept voor het antibioticum heeft u dan al ontvangen.

Een aantal dagen na inname van het antibioticum kunnen er ook nog reacties ontstaan. Blijf hier goed op letten en schrijf op tijdens welk moment welke reacties optreden. Als er in het verleden late reacties zijn opgetreden heeft u de antihistaminica (waarschijnlijk) al in huis. Als dit niet het geval is, ontvangt u bij uw afspraak een recept voor een allergie drankje/tablet; dit drankje/tablet geeft u aan uw kind als er een allergische reactie ontstaat. Zorg dat u dit alvast in huis hebt voor de datum van de test.

#### De uitslag

Een tot twee weken na de test wordt u met uw kind weer op de polikliniek verwacht. Het kan ook zijn dat u een telefonisch afspraak heeft met de arts. Deze afspraak wordt tegelijk met de afspraak voor de provocatietest gemaakt. Tijdens deze afspraak kunt u met uw arts de eventuele late reactie op de test bespreken.

Afhankelijk van de uitslag wordt vastgesteld of de klachten van uw kind wel of niet veroorzaakt worden door het betreffende antibioticum.

#### Negatieve uitslag

Is het resultaat van de test negatief? Dan is uw kind niet allergisch voor het betreffende antibioticum.

### Positieve uitslag

Is het resultaat van de test positief? Dan reageert uw kind met een allergische reactie op het betreffende antibioticum. Er is dan sprake van een allergie. De reactie kan in het ziekenhuis optreden of als uw kind thuis is. Daarom is het verstandig tijdens het gesprek over de uitslag met uw arts de maatregelen te bespreken die deze reacties zoveel mogelijk voorkomen. Uw arts bespreekt dan ook met u wat u kunt of moet doen bij een reactie.

### Vorbereidingen thuis

Als uw kind een antihistaminicum gebruikt, moet hij of zij hier 72 uur voor de antibioticumprovocatietest mee stoppen. In de tabel hieronder zijn de soorten antihistaminica vermeld. Andere medicijnen dan antihistaminica mag uw kind gewoon blijven gebruiken, ook op de testdag. Bij twijfel kunt u het beste van tevoren (telefonisch) overleggen met uw arts.

Alle antihistaminica	
Merknaam	Generieke naam
Aerius	Desloratadine
Allerfre	Loratadine
Claritine	Loratadine
Telfast	Fexofenadine
Tinset	Oxatomide
Promethazine	Promethazine
Mizollen	Mizolastine
Tavegil	Clemastine
Xyzal	Levocetirizine
Zyrtec	Cetirizine

Tabel 1.0: Soorten antihistaminica.

### De testdag

Op de afgesproken tijd meldt u zich met uw kind bij de receptie van het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ). Een vrijwilliger brengt u en uw kind naar de Kinderafdeling (C3). Samen met de verpleegkundige kijkt u of er vlekken te zien zijn op de huid van uw kind of dat er andere ziekteverschijnselen zijn.

Is uw kind voorafgaand aan de test ziek en/of verkouden? Belt u dan de dag vóór het onderzoek tussen 09.00 en 10.00 uur met de polikliniek Kindergeneeskunde,

telefoonnummer: (0182) 50 50 09.

In overleg met u wordt bekeken of uw kind aan de test kan beginnen.

Een lichte verkoudheid is geen belemmering voor de test. Neem bij twijfel contact op met de Kinderafdeling.

Kinderen die op de geplande dag echt ziek zijn (bijvoorbeeld door huiduitslag of als gevolg van benauwdheid), kunnen de test niet doen. Wij vragen u om in dat geval naar de Kinderafdeling te bellen om door te geven dat uw kind ziek is. U kunt bellen naar: (0182) 50 54 61.

### Algemene informatie over het GHZ

Voor algemene informatie over het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) kunt u terecht op: [www.ghz.nl](http://www.ghz.nl). Ook kunt u bellen met het algemene informatienummer: (0182) 50 50 50.

### Adres

Groene Hart Ziekenhuis, locatie Gouda  
Bleulandweg 10  
2803 HH Gouda

### Colofon

uitgave: Groene Hart Ziekenhuis, Gouda  
productie: Marketing & Communicatie  
oktober 2022  
08.04.084