

Schildklierscintigrafie met Technetium

Uw afspraak voor het onderzoek

Datum:

Tijd:

Volg route 70. Wees op tijd! Zo kunnen we het onderzoek op tijd doen.

Waarom doen we dit onderzoek?

Met dit onderzoek kijken we naar de werking en de vorm van uw schildklier.

Wat moet u doen voordat u naar het ziekenhuis komt?

- U moet medicijnen voor uw schildklier tijdelijk stoppen:
 - carbimazol, thiamazol en strumazol minimaal drie dagen
 - propylthiouracil (PTU) minimaal vijftien dagen
 - levothyroxine (Eltroxin®, Euthyrox®, Levothyroxine®, Thyrax®, Thyrofix®, Tirosint®) vier weken
 - trijodothyroxine (Cytomel®) minimaal drie weken
- De volgende producten moeten twee weken gestopt worden:
 - jodiumhoudende hoestdranken
 - multivitaminen
 - visolie
 - homeopathische producten (zoals kelp en zeewier)
 - zeeproducten (zoals povidon zeep en shampoo)
 - hennashampoo/kleurmiddel
- U mag in de drie maanden voor het onderzoek geen CT-scan met contrast gehad hebben;
- Laat uw sieraden thuis.

Tijdens het onderzoek

- U krijgt een tijdelijk infuus in een ader van uw arm;
- Via het infuus krijgt u een radioactieve vloeistof toegediend;
- Hierna gaat u naar een aparte wachtkamer, de wachttijd is ongeveer 15 minuten;
- Na de wachttijd maken we een scan van uw schildklier;
- De scan duurt ongeveer 10 minuten;
- Het is belangrijk dat u tijdens de scan goed stil blijft liggen.

Na het onderzoek

Na de scan kunt u weer naar huis.

Ligt u in het ziekenhuis? Dan gaat u terug naar de afdeling.

De uitslag van het onderzoek is niet meteen bekend. Die krijgt u later van uw behandelend arts.

Kunt u niet komen?

Geef dit dan zo snel mogelijk door. De radioactieve vloeistof die we bij dit onderzoek gebruiken is kostbaar en speciaal voor u besteld.

Bent u zwanger of geeft u borstvoeding?

Neem dan contact op met de afdeling Medische Beeldvorming. In overleg met de arts kijken we of het onderzoek door kan gaan.

Is de straling gevaarlijk?

Nee, de straling is niet gevaarlijk. De hoeveelheid radioactiviteit die we gebruiken is heel klein. Deze hoeveelheid verlaat uw lichaam binnen 24 uur, meestal via de urine.

Daarom is het belangrijk om na het onderzoek extra te drinken. Zo spoelt u de radioactieve vloeistof sneller uit uw lichaam. De urine is niet gevaarlijk voor uw omgeving. U kunt gewoon gebruik maken van elk toilet. De radioactieve vloeistof geeft geen bijwerkingen.

Heeft u nog vragen of opmerkingen?

Bel ons dan gerust. Tijdens het onderzoek kunt u uw vragen stellen aan een medewerker van de afdeling Medische Beeldvorming.

Adres

Groene Hart Ziekenhuis
Afdeling Medische Beeldvorming
Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda
Route 70
Telefoon: 0182-50 50 15

Algemeen telefoonnummer ziekenhuis:
0182- 50 50 50

Colofon

uitgave : Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
productie : Marketing & Communicatie
Januari 2025
05.09.025