

### Met antibioticadrink naar huis

#### Antibioticadrink

Mogelijk is uw kind besmet geraakt met een bacterie. Daarom krijgt u voor uw kind een recept mee naar huis voor een antibioticadrink.

In deze folder vindt u belangrijke informatie voor de periode thuis, nadat uw kind in het ziekenhuis is geweest. Wij vragen u deze folder helemaal te lezen.

Het is belangrijk de antibioticadrink in de koelkast te bewaren. Schud het flesje altijd voor gebruik.

Uw kind mag om de 8 uur, dus 3 keer per dag, de antibioticadrink krijgen. De hoeveelheid op het recept is berekend op basis van het lichaamsgewicht van uw kind. U kunt het drankje het beste voor een voeding geven. Als uw kind binnen 30 minuten na de voeding veel spuugt, dan kunt u het drankje opnieuw geven. Een keer of een paar keer een klein mondje spugen is niet erg.

#### Bijwerkingen

Uw kind kan bijwerkingen (tijdelijke gevolgen) hebben van de antibioticadrink, zoals diarree en darmkrampen. Aangezien de ontlasting van een jonge baby over het algemeen nog wisselend is, is het soms lastig te zeggen of dit het gevolg is van de antibiotica. Deze bijwerkingen hebben geen gevolgen voor later.

Het advies is om 3 keer per dag de temperatuur van uw kind te meten. De temperatuur kunt u met een thermometer rectaal (via de anus/het poepgat) meten. Meet de temperatuur in elk geval tot en met het moment waarop uw kind de laatste portie antibiotica neemt.

Heeft u in de week of enkele weken na na de antibioticakuur het idee dat uw kind minder lekker is of koorts zou kunnen hebben? Meet ook dan de temperatuur van uw kind.

#### Contact opnemen bij problemen

Als uw kind bezig is met de antibioticakuur en het een of meerdere van de volgende bijwerkingen (complicaties) krijgt, moet u contact opnemen met het ziekenhuis. Het telefoonnummer vindt u onder 'Vragen'. Neem contact met ons op als:

- uw kind een temperatuur hoger of gelijk aan 38.0 °C of lager of gelijk aan 36.0 °C heeft;
- uw kind niet wil drinken of de antibioticadrink niet wil innemen;
- uw kind steeds meer overgeeft/spuugt;
- uw kind suf, minder alert is. Een baby slaapt over het algemeen veel, maar moet rondom de voedingsmomenten wel goed wakker worden om te drinken;
- u denkt dat uw kind ernstige bijwerkingen heeft van de antibiotica;
- u zich zorgen maakt vanwege een andere reden.

#### Vragen

Heeft uw kind last van een of meer van de genoemde bijwerkingen? Of heeft u na het lezen van deze folder vragen? Bel dan gerust met een medewerker van de polikliniek Kindergeneeskunde. Het secretariaat is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 10.00 uur en van 14.00 tot 15.00 uur, via: (0182) 50 53 66. Buiten kantoor tijden en in het weekend belt u via: (0182) 50 54 65.

Heeft uw kind de antibioticakuur al gevolgd en heeft u nog vragen? Met deze vragen of met algemene vragen over de gezondheid van uw kind, kunt u bij de huisarts terecht.

**Adres**

Groene Hart Ziekenhuis, locatie Gouda  
Bleulandweg 10  
2803 HH Gouda

**Contact**

Algemeen telefoonnummer Groene Hart  
Ziekenhuis (GHZ): (0182) 50 50 50

**Colofon**

uitgave: Groene Hart Ziekenhuis, Gouda  
productie: Marketing & Communicatie  
mei 2023  
08.05.027