

Radiologie/Chirurgie

Stereotactische biopsie

Inleiding

U heeft binnenkort een afspraak voor het afnemen van een stereotactisch biopt op de afdeling Radiologie.

In deze folder leest u meer over dit onderzoek. Deze folder komt niet in plaats van een gesprek met uw arts. De arts is altijd bereid om u een en ander uit te leggen.

Doel van het onderzoek

Om te bepalen of de afwijking in uw borst kwaadaardig is, moet er weefsel (biopt) worden afgenomen voor microscopisch onderzoek. Soms is de afwijking in de borst niet te zien op de echo. In dat geval wordt de punctie onder geleide van röntgenstralen verricht (stereotactisch biopt).

Gebruikt u bloedverduunners? Neem dan contact met uw behandelend chirurg. Het is belangrijk dat u dit tijdig aangeeft.

Het onderzoek

Een stereotactisch biopt vindt plaats op de afdeling Radiologie. Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de balie Radiologie (route 70).

De laborant zal u vragen om op de buik op de onderzoektafel te gaan liggen met de borst in een gat in deze tafel. De radioloog zoekt met röntgenapparatuur de betreffende plek in uw borst. Zodra de plek is gevonden brengt de radioloog met hulp van de computer een holle naald in uw borst. Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving. Met deze holle naald kan de radioloog stukjes weefsel wegnemen.

Daarna laat de radioloog een marker achter op de plaats van de biopsie, zodat op de

foto zichtbaar is waar de biopten zijn genomen.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 60 minuten.

Na het onderzoek

Het wondje wordt afgeplakt met een kleine witte pleister. Deze mag maximaal één week blijven zitten. Over deze pleister zit een grotere pleister, deze mag u na 24 uur verwijderen. Voor de eerste 24 uur geldt dat het wondje niet nat mag worden.

Ook mag u geen zware arbeid verrichten of sporten met de arm aan de kant waar het biopt is afgenomen.

Het is verstandig dat u na afloop van het onderzoek niet alleen naar huis gaat.

Risico's en complicaties

Ondanks dat de insteekplaats verdoofd wordt, kan het onderzoek toch pijnlijk zijn. Bij thuiskomst kunt u eventueel de borst ongeveer 10 minuten koelen met bijvoorbeeld een plastic zakje met ijsblokjes gewikkeld in een handdoek. Herhaal dit na een uur nogmaals. Ook kunt u paracetamol nemen als u dat nodig vindt.

Het is mogelijk dat na de stereotactische biopsie een bloeduitstorting of infectie optreedt op de plaats waar gebiopteerd is. Het is daarom belangrijk om bij toenemende roodheid of zwelling van de borst of als u koorts krijgt, contact op te nemen met uw behandelend specialist of mamma-care verpleegkundige tel (0182) 50 59 67.

Er is een kleine kans dat na de stereotactische biopsie een nabloeding optreedt. U moet dan tegendruk blijven

geven tot de bloeding gestopt is. Indien de bloeding na een half uur niet gestopt is, neem dan contact op met uw behandelend arts.

Uitslag

De secretaresse heeft voor u een afspraak bij de chirurg gemaakt voor de uitslag van het onderzoek en de eventuele verdere behandeling.

Vragen?

In deze folder hebben we het één en ander verteld over een stereotactisch biopt. Misschien heeft u na het lezen van deze folder vragen die niet kunnen wachten tot het onderzoek. U kunt uw vragen stellen aan de mamma-care verpleegkundige van de polikliniek Chirurgie, tel. (0182) 50 59 67.

Tot slot

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u terecht op onze website: www.ghz.nl. Ook kunt u dagelijks bellen naar het algemene informatienummer (0182) 50 50 50.

Uw afspraak is opdag

d.d.

om uur

U wordt verwacht op de
afdeling Radiologie, route 70.
GHZ, Bleulandweg 10, Gouda.

Als u uw afspraak niet ten minste 24 uur van te voren hebt afgezegd, kunnen u kosten in rekening worden gebracht.

Colofon

uitgave : Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
productie : Marketing & Communicatie
oktober 2017
04.04.123