

Inbrengen peritoneaal katheter

Inleiding

Binnenkort wordt bij u een peritoneaal dialysekatheter ingebracht. Deze folder geeft informatie over de peritoneaal dialysekatheter, het inbrengen en waar u op moet letten na de operatie. De informatie komt natuurlijk niet in plaats van een gesprek met uw arts. Hij of zij zal steeds bereid zijn om u persoonlijk een en ander uit te leggen en op uw vragen in te gaan.

Doel van de operatie

De peritoneaal dialysekatheter is nodig voor dialyse via de buikholte. Het inbrengen van deze katheter gebeurt operatief onder algehele narcose.

Let op

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, geef dit dan door aan de chirurg. U kunt dan samen passende afspraken hierover maken.

Wat neemt u mee?

- Actuele medicatielijst
- Kleding en andere artikelen voor een overnachting in het ziekenhuis
- Uw zorgverzekeringspapieren
- Uw identificatiebewijs.

Wij raden u dringend aan om waardevolle bezittingen thuis te laten.

Wat is een peritoneaal dialysekatheter?

Om in- en uitloop van de spoelvloeistof mogelijk te maken is het noodzakelijk een katheter door de buikwand heen in de buikholte te leggen. Het uiteinde van de katheter ligt in het diepste punt van de buikholte.

Zo is het mogelijk om de spoelvloeistof goed en volledig in en uit te laten lopen.

De katheter is van soepel, zacht kunststof materiaal gemaakt en de totale lengte ervan is 42 centimeter. Het uitwendige deel van de katheter is ongeveer 40 centimeter lang. Voor de levensduur van de katheter is het van belang om trekken aan de katheter te voorkomen. Zo kan de katheter beter in het weefsel vast groeien.

De dag voor de operatie

Als er huidafwijkingen zijn op de buik, zoals roodheid, zwelling of, puistjes, dan geeft u dit telefonisch door aan de dialyseafdeling.

's Morgens neemt u twee dulcolax (bisocadyl) tabletten in om de darmen leeg te maken. Het recept hiervoor heeft u van de dialyse-verpleegkundige gekregen.

Na 24.00 uur moet u nuchter blijven (niet meer eten of drinken).

NB: als de operatie in de middag plaatsvindt, mag u als ontbijt één beschuit en een kopje thee nemen.

De plaats van de katheter

Voorafgaand aan het plaatsen van de katheter neemt de dialyseverpleegkundige de plaatsbepaling van de katheter met u door. Dit kan tijdens een huisbezoek, de peritoneaal dialysetraining of op de ochtend van de operatie zijn. In het laatste geval zal dit dan plaatsvinden op de afdeling waar u bent opgenomen.

De richtlijn is als volgt:

- De katheter zal ongeveer 10 cm van de navel -schuin naar beneden, links of rechts (naar uw voorkeur) – geplaatst worden. De katheter wordt niet in de bovenbuik geplaatst.

- De huidpoort (de plaats waar de katheter uit de buik komt) mag niet in een huidplooi vallen. Voor de plaatsbepaling is een zittende houding het beste, zodat eventuele huidplooien goed zichtbaar zijn.
- U moet verder rekening houden met uw voorkeurshouding tijdens het slapen en waar de band van uw broek en/of rok, ondergoed en eventuele zwemkleding zit. De katheter moet hier namelijk niet recht onder zitten, om afknellen te voorkomen.

Dag van de operatie

In het ziekenhuis meldt u zich op de afgesproken tijd bij de balie bij de hoofdingang van het ziekenhuis. Vervolgens brengt een gastheer/vrouw u naar de verpleegafdeling. De dialyse-verpleegkundige komt langs om de plaats van de katheter af te tekenen met een viltstift.

Voor de operatie moet u, zo mogelijk, uitplassen.

De operatie

U wordt eerst onder algehele narcose gebracht. De chirurg brengt de katheter vervolgens in de buikholte. U houdt een kleine snee onder de navel over aan de operatie (ongeveer 5 cm lang).

De operatie duurt 30 tot 45 minuten. Daarna wordt u teruggebracht naar de uitslaapkamer en tenslotte naar de afdeling.

De dag na de operatie

Als er geen complicaties zijn, mag u dezelfde dag of de dag na de operatie het ziekenhuis verlaten (u mag met ontslag).

Vaak worden er oplosbare hechtingen gebruikt; deze verdwijnen vanzelf.

Een controleafspraak bij de chirurg is alleen noodzakelijk als er geen oplosbare hechtingen worden gebruikt.

De dialyseverpleegkundige geeft u een afspraak mee voor wond- en huidpoortcontrole op de afdeling Dialyse, na 5 tot 7 dagen. Het verband moet u laten zitten en u mag niet douchen.

Complicaties

Neemt u contact op met de dialyseafdeling bij:

- Flink nabloeden; als het bloed door het verband heen komt.
- Koorts (vanaf 37.5 °C).
- Obstipatie (de ontlasting komt niet op gang).

Aandachtspunten en leefregels voor na de operatie:

- Draag geen knellende kleding.
- Til geen zware voorwerpen.
- Doe geen buikspieroefeningen.
- U gebruikt dagelijks 1 zakje movicolon tot 10 dagen na de operatie om obstipatie te voorkomen.
- Ondersteun uw buik bij hoesten of niezen.

Meer informatie vindt u in de informatiemap *peritoneaal dialyse*, onder het hoofdstuk 'de huidpoort en lifestyle'.

Tot slot

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u terecht op onze website: www.ghz.nl. Ook kunt u bellen naar het informatienummer (0182) 50 50 50.

Vragen?

In deze folder hebben we u een en ander verteld over een het plaatsen van een peritoneaal dialysekatheter. Heeft u na het lezen vragen of zijn er problemen, dan kunt u bellen met onze afdeling Dialyse op maandag t/m zaterdag van 7.30 tot 22.00 uur, telefoonnummer (0182) 50 54 22.

Tijdens uw opname kunt u vragen stellen aan de arts of de verpleegkundige. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Colofon

uitgave : Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
productie : Marketing & Communicatie
augustus 2019
08.10.018