

### Bijschildklierscintigrafie

#### Uw afspraak voor het onderzoek

Datum: .....

Tijd: ..... en .....

Volg route 70. Wees op tijd! Zo kunnen we het onderzoek op tijd doen.

#### Waarom doen we dit onderzoek?

Met dit onderzoek kijken we naar de plaats en werking van de bijschildklieren.

#### Wat moet u doen voordat u naar het ziekenhuis komt?

- U moet medicijnen die het onderzoek beïnvloeden tijdelijk stoppen:
  - calciumhoudende medicatie 2 dagen (bijv. calcit, calci-chew, calcium bruis, calciumcarbonaat, calciumgluconaat, calciumlactaat, calcium-sandoz);
  - vitamine D 1 week (bijv. alfa calcido, etalpha, cholecalciferol, D-cura, divisun, devaron);
  - cinacalcet 2 weken;
- U moet medicijnen voor uw schildklier tijdelijk stoppen:
  - carbimazol, thiamazol en strumazol minimaal 3 dagen
  - propylthiouracil (PTU) minimaal 15 dagen
  - levothyroxine 4 weken (Eltroxin®, Euthyrox®, Levothyroxine®, Thyrax®, Thyrofix®, Tirosint®)
  - Cytomel® minimaal 3 weken;
- De volgende producten moeten 2 weken gestopt worden:
  - jodiumhoudende hoestdranken;
  - multivitaminen;
  - visolie;
  - homeopathische producten (zoals kelp en zeewier)- zeepproducten (zoals povidon zeep en shampoo);
  - hennashampoo/kleurmiddel;

- U mag in de 6 maanden voor het onderzoek geen CT-scan met contrast gehad hebben;
- Laat uw sieraden thuis.

#### Tijdens het onderzoek

- U krijgt een tijdelijk infuus in een ader van uw arm;
- Via het infuus krijgt u een radioactieve vloeistof toegediend;
- Hierna gaat u naar een aparte wachtkamer, de wachttijd is ongeveer 15 minuten;
- Na de wachttijd maken we een scan van uw halsgebied;
- De scan duurt ongeveer 10 minuten;
- Het is belangrijk dat u tijdens de scan goed stil blijft liggen;
- Na de scan krijgt u nogmaals een radioactieve stof toegediend;
- Hierna is de wachttijd 1 uur;
- Tijdens deze wachttijd hoeft u niet op de afdeling te blijven;
- Na deze wachttijd maken we nogmaals een scan van uw halsgebied;
- De scan duurt ongeveer 45 minuten;
- Het is belangrijk dat u tijdens de scan goed stil blijft liggen;
- Soms wordt er op een later tijdstip nogmaals een scan gemaakt;
- Deze scan duurt 5 tot 10 minuten.

#### Na het onderzoek

Na de scan kunt u weer naar huis. Ligt u in het ziekenhuis? Dan gaat u terug naar de afdeling.

De uitslag van het onderzoek is niet meteen bekend. Die krijgt u later van uw behandelend arts.

#### Kunt u niet komen?

Geef dit dan zo snel mogelijk door. De radioactieve vloeistof die we bij dit onderzoek

gebruiken is kostbaar en speciaal voor u besteld.

### **Bent u zwanger of geeft u borstvoeding?**

Neem dan contact op met de afdeling Medische Beeldvorming. In overleg met de arts kijken we of het onderzoek door kan gaan.

### **Is de straling gevaarlijk?**

Nee, de straling is niet gevaarlijk. De hoeveelheid radioactiviteit die we gebruiken is heel klein. Deze hoeveelheid verlaat uw lichaam binnen 24 uur, meestal via de urine. Daarom is het belangrijk om na het onderzoek extra te drinken. Zo spoelt u de radioactieve vloeistof sneller uit uw lichaam. De urine is niet gevaarlijk voor uw omgeving. U kunt gewoon gebruik maken van elk toilet. De radioactieve vloeistof geeft geen bijwerkingen.

### **Heeft u nog vragen of opmerkingen?**

Bel ons dan gerust. Tijdens het onderzoek kunt u uw vragen stellen aan een medewerker van de afdeling Medische Beeldvorming.

### **Adres**

Groene Hart Ziekenhuis  
Afdeling Medische Beeldvorming  
Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda  
Route 70  
Telefoon: (0182) 50 50 15

Algemeen telefoonnummer ziekenhuis:  
(0182) 50 50 50

### **Colofon**

uitgave : Groene Hart Ziekenhuis, Gouda  
productie : Marketing & Communicatie  
februari 2025  
05.09.031