


Plaatsen Hickman-katheter (CVK- Centraal Veneuze Katheter)

De arts heeft met u gesproken over het plaatsen van een Hickman-katheter. Dit is een speciale lijn die gebruikt wordt om medicijnen en voeding te geven.

Belangrijke punten:

- De Hickman-katheter is een zacht en buigzaam slangetje. Het wordt gebruikt voor het geven van medicijnen, voeding of vloeistoffen. Deze lijn kan lang blijven zitten.
- U mag gewoon eten en drinken
- U wordt voor deze behandeling opgenomen. Als alles goed is gegaan, gaat u dezelfde dag weer naar huis.
- Doe de eerste dag na de behandeling rustig aan doen.



Wat is een Hickman-katheter

Een Hickman-katheter is een soepel slangetje waarvan het uiteinde in een grote ader ligt vlakbij het hart. De katheter gaat het eerste stuk van 10 centimeter onder uw huid door zodat de kans op ontsteking kleiner wordt. Dit noemen we getunneld.

Aan het einde van de katheter zit onder de huid een bandje (een cuff). Deze groeit vast. Zo wordt de kans op ontsteking nog kleiner en blijft de katheter op zijn plek. Het wordt gebruikt voor het geven van medicijnen, voeding of vloeistoffen. Deze lijn kan lang blijven zitten.

Hoe gaat de behandeling

We plaatsen deze katheter in uw hals, het liefst aan de rechterkant. De katheter wordt vastgehecht en wordt afgeplakt met een pleister. De hechtingen worden verwijderd als de cuff goed is vastgegroeid (na ongeveer

Uw afspraak:

Dag:.....

Datum:.....

Tijd:.....

U meldt zich bij: de balie van de centrale hal van het ziekenhuis

3 weken). In de hals zit ook een hechting. Deze wordt na ongeveer een week verwijderd.

Dag van de behandeling

Aankomst

- U wordt voor deze behandeling opgenomen.
- U meldt zich op de afgesproken tijd bij de balie in de centrale hal van het ziekenhuis.
- Een medewerker brengt u naar de verpleegafdeling.

Eten en drinken

- U mag gewoon eten en drinken.

Medicijnen

- U mag uw medicijnen op de dag van de behandeling gewoon innemen.
- Gebruikt u bloedverdunners?
Uw arts zegt u of u hiermee even moet stoppen of dat u een ander medicijn krijgt.

Afspraken over uw medicijnen

- Stoppen innemen bloedverdunners
Ja / Nee
Zo ja, vanaf welke datum?
.....
- Tijdelijk andere medicijnen?
Ja / Nee
Zo ja, welke en tot wanneer?
.....

Het team

De behandeling wordt gedaan door:

- Een arts (interventieradioloog)
- 2 medewerkers (interventielaboranten)

De voorbereiding

Voordat u voor de behandeling naar de afdeling Radiologie gaat krijgt u antibiotica om de kans op een ontsteking zo klein mogelijk te houden.

Ook krijgt u een speciaal jasje aan met drukknopen. U wordt in bed naar de afdeling Radiologie gebracht.

De behandeling

In de behandelkamer gaat u op de behandeltafel liggen en wordt de hals schoongemaakt (ontsmet).

Daarna krijgt u een laken over u heen. Het laken bedekt een klein deel van uw gezicht, maar niet de ogen, neus en mond.

Met een echo-apparaat kijkt de arts om een goede plek te vinden voor het inbrengen van de katheter.

Op die plek krijgt u een verdovingsprik. Bij het plaatsen van een getunnelde lijn wordt er ook ongeveer 10 cm onder het sleutelbeen ook verdoofd om het tunneltje te maken.

Na het plaatsen wordt de katheter vastgehecht aan de huid.

De behandeling duurt ongeveer 1 uur.

Na de behandeling

Na het inbrengen kan het halsgebied wat gevoelig zijn. Soms kan het nog een beetje bloeden bij de aanprikplaats.

De dialyse katheter kan meteen worden gebruikt. Als alles goed gaat kunt u na de behandeling naar huis.

Het is belangrijk om een ontsteking te voorkomen:

- Daarom mag u niet zwemmen of in bad.
- De plek waar de katheter zit mag niet met douchen nat worden.
U kunt met de dialyseverpleegkundige overleggen hoe u veilig kunt douchen.
- Om een mogelijke infectie snel te kunnen ontdekken, meet u elke morgen uw temperatuur.

Mogelijke bijkomende klachten

Net als bij elke andere behandeling kunnen er problemen of klachten (complicaties) ontstaan.

Meestal kunnen ze snel worden verholpen.

Tijdens de behandeling:

- Bloeding (dit komt heel weinig voor)

Na de behandeling:

- Nabloeden bij de insteekopening (dit komt vaak voor)
- Infectie (dit komt af en toe voor)

Extra maatregel om infectie te voorkomen

U krijgt een recept mee voor neuszalf (Bactroban). Om geen ontsteking te krijgen smeert u deze zalf twee keer per dag in de neus. Eén keer per maand vijf dagen achter elkaar.

Met een wattenstokje of uw vinger smeert u de neuszalf aan de binnenkant van beide neusgaten. Daarna knijpt u zachtjes in de neus om de zalf goed te verdelen.

Wanneer belt u met de Dialyse afdeling?

- Als het bloed onder de pleister doorlekt. (De aanprikplek kan wat nabloeden).
- Als de aanprikplek open ligt doordat de pleister is los gegaan.
- Als uw temperatuur boven de 37,5 °C is. Het is dus belangrijk dat u elke morgen uw temperatuur meet.

Belt u dan naar de dialyse afdeling
0182-50 54 22.

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met zaterdag, van 7.30 uur 's ochtends tot 22.00 uur 's avonds.

Buiten deze tijden kunt u het algemene nummer van het ziekenhuis bellen.
(0182) 505050.

Kunt u niet komen?

Laat dit dan zo snel mogelijk weten.
U belt hiervoor met het ziekenhuis.
(0182) 50 50 50
Vraag naar de afdeling Opname.

Heeft u nog vragen?

Belt u dan naar de afdeling Medische Beeldvorming Radiologie.
(0182) 50 50 15.
We zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag, tussen 8.00 en 17.00 uur.

Algemeen telefoonnummer ziekenhuis

(0182) 50 50 50

Groene Hart ziekenhuis

Bleulandweg 10
2803 HH Gouda
www.ghz.nl

*Wij proberen rekening te houden met uw voorkeur voor een mannelijke of vrouwelijke medewerker.
Helaas is dit niet altijd mogelijk.*

Colofon

uitgave : Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
productie : Marketing & Communicatie
november 2025
05.08.124