

Informatie over een dialysekatheter

Informatie voor **klinische** en **poliklinische** patiënten

U krijgt binnenkort een dialysekatheter. Deze katheter wordt in de bloedbaan gebracht en is noodzakelijk om te kunnen dialyseren. In deze folder krijgt u informatie over de dialysekatheter, de plaats en de verzorging hiervan.

Waarom een dialysekatheter?

U krijgt een dialysekatheter als u acuut moet gaan dialyseren of als u nog geen dialysehunt hebt en u met dialyse gaat starten.

Wat is een dialysekatheter?

Een dialysekatheter is een kunststof slangetje met een lengte van 20 à 25 cm. De katheter kan op verschillende plaatsen in uw bloedbaan worden gebracht:

- in uw lies;
- boven het sleutelbeen;
- in de hals.

De keuze van de katheter en van de plaats hangt af van uw gewicht, uw lengte en hoelang de katheter gaat gebruiken. Uiteraard bespreken wij met u waarom wij voor een bepaalde katheter en plaats kiezen.

Vorbereiding

Voor het inbrengen van een katheter hoeft u geen speciale voorbereidingen te treffen. Wel is het handig om makkelijke kleding aan te trekken die goed wasbaar is. Het kan zijn dat er bloed op uw kleding komt tijdens de ingreep.

Als u een katheter in de hals krijgt, wilt u dan uw (hals)sierraden van te voren afdoen? Soms wordt van tevoren bloed afgenomen om de stolling te bepalen.

U krijgt hier vooraf bericht over.

Dag van inbrengen

U hoort van de voren waar u zich moet melden. Dit kan op de afdeling Dialyse zijn of op een verpleegafdeling. U krijgt dan een bed toegewezen.

De dialysekatheter in de lies

Een dialysekatheter in de lies is altijd tijdelijk. Een arts brengt de katheter in op de afdeling Dialyse. U krijgt eerst een plaatselijke verdoving in uw lies. Vervolgens brengt de arts de katheter in en hecht hem vast aan uw huid. U kunt direct hierna beginnen met dialyseren. Soms ontstaat een bloeduitstorting bij de plaats waar de katheter is ingebracht. Een nadeel van de dialysekatheter op deze plaats is de grote kans op infectie. Daarom zoeken we bij langdurige dialyse naar een andere toegang tot de bloedbaan.

De dialysekatheter bij het sleutelbeen

Ook een dialysekatheter bij het sleutelbeen is tijdelijk. Een arts brengt de katheter meestal in op de afdeling Dialyse soms vind het inbrengen plaats op de afd. Radiologie.

U krijgt eerst een plaatselijke verdoving bij uw sleutelbeen. Vervolgens wordt de katheter ingebracht en vastgehecht aan uw huid.

Daarna gaat u naar de afdeling Radiologie voor een controlefoto. De foto moet bevestigen of de katheter op de goede plaats zit.

De dialysekatheter in de hals

Een dialysekatheter in de hals kan langere tijd blijven zitten.

Het inbrengen van de katheter gebeurt door de arts op de afdeling Dialyse of door de Radioloog op de afdeling Radiologie.

Op de verpleegafdeling krijgt u een infuusnaaldje waardoor u antibiotica krijgt. Vervolgens wordt u aangesloten op een monitor waar door middel van plakkers op uw borst kan uw hartritme worden bewaakt. De katheter wordt in uw bloedbaan gebracht waarbij een gedeelte van de katheter onder uw huid wordt geleid. Het onderhuidse gedeelte heet ook wel een tunnel. Door dit "tunnelen" groeit de katheter vast. Het tunnelen van de katheter kan als pijnlijk ervaren worden. Een tunnel verkleint de kans op infectie.

Indien de katheter ingebracht is op de dialyseafdeling wordt er nog een controlefoto gemaakt. De foto moet bevestigen of de katheter op de goede plaats zit

Hoe lang duurt het?

Het inbrengen van een katheter duurt gemiddeld een half uur tot een uur. Als de katheter op de goede plaats zit kunt u naar huis of kunt u starten met de dialyse behandeling.

Mogelijke complicaties van een katheter bij het sleutelbeen of in de hals

Tijdens het inbrengen van deze katheter zijn (zeldzame) risico's aanwezig. Er bestaat een kans dat uw long wordt aangeprikt waardoor een 'klaplong' kan ontstaan. Ook kunt u een bloeding krijgen op de plaats waar de katheter is ingebracht.

Na het inbrengen

- Na het inbrengen van de katheter kunt u pijn hebben op de plaats waar de katheter is ingebracht. U kunt hiervoor een tablet paracetamol innemen.
- De katheter kan de dag van de ingreep wat nabloeden op de plaats waar de katheter is ingebracht. Neem contact op met de afdeling Dialyse als er bloed onder de pleister uitloopt.
- Neem iedere ochtend uw temperatuur op. Als deze hoger is dan 37,5°C belt u de dialyse afdeling.

- U mag kort douchen, ook als de hechtingen er nog in zitten.

Problemen thuis

Als zich thuis complicaties voordoen, neemt u dan contact op met uw huisarts of met de afdeling Dialyse.

Bij acute problemen kunt u de afdeling Dialyse bereiken op telefoonnummer: (0182) 50 54 22. Van maandag tot en met zaterdag van 7.30 - 22.00 uur. Buiten deze uren en op zondag kunt u ons bereiken via het algemene nummer van het Groene Hart Ziekenhuis: (0182) 50 50 50. Vraag dan naar de dienstdoende dialysearts.

Tot slot

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u terecht op onze website: www.ghz.nl. Ook kunt u bellen naar het algemene informatienummer (0812) 50 50 50.

Vragen?

Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, belt u ons dan gerust. U kunt ons bereiken van maandag t/m zaterdag van 7:30 – 22:00 uur, op telefoonnummer: (0182) 50 54 22.

Bent u opgenomen op een verpleegafdeling dan kunt u uw vragen stellen aan de arts of verpleegkundige. Eventueel komt een dialyseverpleegkundige extra uitleg geven.

Colofon

uitgave : Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
productie : Marketing & Communicatie
september 2018
08.10.011