

Maagslijmvliesscintigrafie

Uw afspraak voor het onderzoek

Datum:

Tijd:

Volg route 70. Wees op tijd! Zo kunnen we het onderzoek op tijd doen.

Waarom doen we dit onderzoek?

Met dit onderzoek kijken we of er zich een stukje maagslijmvlies in uw darm bevindt.

Wat moet u doen voordat u naar het ziekenhuis komt?

- De volgende medicijnen mag u vanaf 3 dagen voor het onderzoek niet meer innemen: metoclopramide, domperidon, cimetidine, scopolamine, morfine, oxycodon, laxantia (movicolon, lactulose), glucagon en barium;
- In de week voor het onderzoek mag u geen darmonderzoek met contrastmiddelen op de afdeling radiologie hebben gehad;
- Vanaf 4 uur voor het onderzoek mag u niets meer eten of drinken;
- Draag kleding zonder metalen onderdelen;
- Laat uw sieraden thuis.

Tijdens het onderzoek

- Eén uur vóór het onderzoek krijgt u een medicijn toegediend om de kwaliteit van de scan te verbeteren;
- Daarna wordt u opgehaald uit de wachtkamer en gaat u naar het toilet;
- U krijgt een tijdelijk infuus in een ader van uw arm;
- Via het infuus krijgt u een radioactieve vloeistof toegediend;
- Tegelijkertijd wordt er een scan gemaakt van uw buik. Deze scan duurt 45 minuten;
- Het is belangrijk dat u tijdens de scan goed stil blijft liggen;

- Hierna plast u nogmaals en wordt er nog een korte scan gemaakt.

Het hele onderzoek duurt 60 minuten.

Na het onderzoek

Na de scan kunt u weer naar huis.

Ligt u in het ziekenhuis? Dan gaat u terug naar de afdeling.

De uitslag van het onderzoek is niet meteen bekend. Die krijgt u later van uw behandelend arts.

Kunt u niet komen?

Geef dit dan zo snel mogelijk door. De radioactieve vloeistof die we bij dit onderzoek gebruiken is kostbaar en speciaal voor u besteld.

Bent u zwanger of geeft u borstvoeding?

Neem dan contact op met de afdeling Medische Beeldvorming. In overleg met de arts kijken we of het onderzoek door kan gaan.

Is de straling gevaarlijk?

Nee, de straling is niet gevaarlijk. De hoeveelheid radioactiviteit die we gebruiken is heel klein. Deze hoeveelheid verlaat uw lichaam binnen 24 uur, meestal via de urine. Daarom is het belangrijk om na het onderzoek extra te drinken. Zo spoelt u de radioactieve vloeistof sneller uit uw lichaam. De urine is niet gevaarlijk voor uw omgeving. U kunt gewoon gebruik maken van elk toilet. De radioactieve vloeistof geeft geen bijwerkingen.

Heeft u nog vragen of opmerkingen?

Bel ons dan gerust. Tijdens het onderzoek kunt u uw vragen stellen aan een medewerker van de afdeling Medische Beeldvorming.

Adres

Groene Hart Ziekenhuis
Afdeling Medische Beeldvorming
Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda
Route 70
Telefoon: (0182) 50 50 15

Algemeen telefoonnummer ziekenhuis:
(0182) 50 50 50

Colofon

uitgave : Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
productie : Marketing & Communicatie
juli 2024
05.09.029