

Port-a-Cath (PAC)


Uw arts heeft besloten dat u binnenkort een Port-a-Cath (PAC) krijgt. Deze folder geeft u meer informatie over deze behandeling.

Belangrijke punten:

- Een PAC komt onder de huid in uw borst.
- De operatie duurt ongeveer 30 minuten.
- U krijgt een implantatiebewijs. Vraag ernaar als u deze niet krijgt.
- Via de PAC krijgt u medicijnen of vloeistoffen.
- Na herstel van de wond kunt u alles weer doen zoals zwemmen en sporten.
- Bel de arts bij roodheid, zwelling, pijn of koorts.
- Vragen? Bel 0182 – 50 54 21.

Wat is een PAC?

Een PAC is een klein kastje (reservoir) met een dun slangetje (katheter). Dit kastje wordt onder de huid geplaatst, meestal op de borst. De katheter loopt via een bloedvat naar een plek net boven het hart. Alles zit onder de huid en is niet te zien aan de buitenkant van het lichaam. Het kastje kan jarenlang blijven zitten. Een PAC is speciaal gemaakt om bloedafname en het geven van medicijnen makkelijker te maken.



Bron beeld: Tergooi MC

Waarom krijg ik een PAC?

Het toedienen van bepaalde medicijnen of voeding via een infuus in uw arm, kan uw bloedvaten irriteren. Daarom heeft u een speciale toegangsweg nodig. Door het slangetje van de PAC in een groot bloedvat te plaatsen sparen we de kleine bloedvaten. De PAC kunnen we ook gebruiken voor bloedafname.


De behandeling

- Voor de plaatsing wordt er een afspraak gemaakt bij de chirurg.
- Na het gesprek met de chirurg wordt er een afspraak gemaakt voor de operatie.
- De operatie duurt ongeveer 30 minuten en gebeurt onder narcose. Hierbij bent u in slaap.
- Er worden 2 kleine sneetjes in de huid gemaakt: 1 voor het kastje en 1 voor het katheter.
- Het kastje wordt vastgezet met oplosbare hechtingen.
- Na de ingreep wordt een controlefoto gemaakt. Daarna kan de PAC meestal direct worden gebruikt.
- Voordat u het ziekenhuis verlaat, ontvangt u een implantatiebewijs. Op dit kaartje staan alle gegevens over uw PAC. Draag dit altijd bij u.

Aan het plaatsen van een PAC zijn risico's verbonden. Uw arts bespreekt deze met u.

Aanprikken en gebruik

Om bij het reservoir van de PAC te komen, moet er een naald door de huid worden geprikt. Dit mag alleen een speciaal opgeleide verpleegkundige of arts doen. De prik kan gevoelig zijn.



Bron beeld: Amsterdam UMC

Via de naald worden medicijnen of vloeistoffen direct in uw bloedvat gebracht. De naald wordt met een pleister vast gemaakt. Vaak wacht de arts een week voordat de PAC voor het eerst wordt gebruikt. Als medicijnen meerdere dagen nodig zijn, blijft de naald zitten. Dit kan in het ziekenhuis of thuis, met hulp van een speciaal team voor thuiszorg.

Doorspoelen

Na elke behandeling wordt de PAC doorgespoeld met een vloeistof. Dit is om verstopping te voorkomen. Als de PAC niet wordt gebruikt, moet deze 1 keer per 3 maanden worden doorgespoeld.

Belangrijke aandachtspunten

- Wanneer de wond hersteld is, kunt u alles weer doen.
- Controleer regelmatig de plek waar de naald is ingebracht.
- Neem contact op met uw arts bij deze klachten:
 - Roodheid;
 - Zwelling;
 - Irritatie;
 - Pijn;
 - Koorts, 38 graden of hoger.
- PAC's worden over de hele wereld gebruikt. In bijna elk land kunnen artsen u helpen.
- U kunt met de PAC door de detectiepoortjes van het vliegveld en winkels. Draag altijd uw implantatiebewijs bij u.

- De PAC wordt ook gebruikt voor het inbrengen van contrastvloeistof. Bijvoorbeeld bij een CT scan. Hiervoor gaat u naar het Behandelcentrum Oncologie en Hematologie.

Heeft u nog vragen?

Bel op werkdagen tussen 8.00 uur en 16.30 uur met het Behandelcentrum Oncologie en Hematologie via 0182 - 50 54 21.

Groene Hart Ziekenhuis, Locatie Gouda

Bleulandweg 10
2803 HH Gouda
0182 - 50 50 50
www.ghz.nl

Colofon

uitgave : Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
productie : Marketing & Communicatie
april 2025
04.07.082