

Coeliacus blokkade (Splanchnicus blokkade)

Inleiding

Deze folder geeft u informatie over een coeliacus blokkade. Uw pijnspecialist heeft deze behandeling al met u besproken.

Coeliacus/ Splanchnicus blokkade

Een coeliacus blokkade is een blokkade van een netwerk van zenuwen in de bovenbuik. Dit zenuwnetwerk wordt plexus coeliacus genoemd en is belangrijk voor pijngeleiding van de meeste organen in de buik en ligt aan de voorzijde van de wervelkolom.

Het aanbrengen van een blokkade op die plaats, kan worden toegepast bij ernstige pijnklachten in de bovenbuik als gevolg van bijvoorbeeld kanker van de bovenbuikorganen (alvleesklier, maag, lever). Bij deze behandeling is het doel om ernstige pijn te verminderen. Voor deze blokkade wordt fenol gebruikt, wat de zenuw stuk maakt. Hierdoor kan deze minder pijnsignalen doorgeven.

Vorbereiding

Als u medicijnen voor antistolling gebruikt zal de pijnspecialist met u bespreken of/en wanneer u met deze medicatie moet stoppen. En wanneer u na de behandeling weer kunt starten. Voor de dag van behandeling maken we met u een afspraak om uw bloedstolling te controleren.

De behandeling vindt plaats onder sedatie. Dit is een lichte slaap die het bewustzijn en de pijn vermindert, waardoor u minder ongemak ervaart van de behandeling. Na de behandeling slaapt u uit op de uitslaapkamer.

Vorbereiding op de sedatieprocedure

Voor volwassenen geldt:

- Tot 6 uur voor het tijdstip dat u zich in het ziekenhuis moet melden, mag u nog eten of drinken.
- Vanaf 6 uur tot 2 uur voor het tijdstip dat u zich in het ziekenhuis moet melden, mag u alléén nog de volgende dranken drinken: water, thee, appelsap of aanmaaklimonade (heldere vloeistof zonder prik/koolzuur).
- Vanaf 2 uur voor de opname tot aan het moment van de ingreep, mag u niets eten of drinken. U mag wel **slokjes** water als u bijvoorbeeld dorst heeft of als u medicijnen in moet nemen.



Waarom mag u voor een onderzoek/ behandeling niet eten of drinken?

De maag moet leeg zijn. Een lege maag voorkomt dat de inhoud van de maag in de longen terecht komt. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor uw gezondheid. Door nuchter te blijven, kunnen ernstige complicaties worden voorkomen. Uw pijnspecialist kan eventueel andere afspraken met u maken als u een ingreep ondergaat waarvoor u om bepaalde redenen langer nuchter moet zijn.

De dag van behandeling

Op de dag van behandeling komt u nuchter naar het GHZ. U mag wel uw eigen medicatie met water innemen, tenzij anders door de pijnspecialist aangegeven. Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de receptie bij de hoofdingang van het ziekenhuis. U wordt begeleid naar de Dagbehandeling (D2 -route 37) waar u

tijdelijk wordt opgenomen. Van daaruit begeleidt de pijnconsulent u naar de behandelkamer, waar de behandeling plaatsvindt.

Als u bloed moet laten prikken voor de opname op de Dagbehandeling, dan kunt u dit doen bij de bloedafname (route 27).

Belangrijk

- Verwijder nagellak en make-up. Het is belangrijk dat de natuurlijke kleur van uw huid en nagels te zien is.
- Bril of lenzen worden gevraagd af/uit te doen.
- Laat waardevolle spullen thuis.

De behandeling

De behandeling vindt plaats op de behandelkamer. De pijnconsulent zal de bewakingsapparatuur aansluiten en u krijgt een infuusnaaldje in uw hand of arm. U krijgt zuurstof toegediend via een slangetje in de neus.

Tijdens de behandeling ligt u op uw buik. Bij de behandeling krijgt u twee naalden in de rug aan beide zijden van de wervelkolom tot de voorzijde van de wervelkolom wordt bereikt.

Dit wordt gecontroleerd door middel van röntgendoorlichting en contrastmiddel. Als de juiste plaats is bereikt wordt de medicatie ingespoten. Op de prikplaats wordt een pleister geplakt die thuis verwijderd kan worden.

De behandeling duurt ongeveer 30 tot 60 minuten.

Na de behandeling

Als de behandeling klaar is, wordt de sedatie stopgezet. U zult snel weer wakker worden op de uitslaapkamer, waar een verpleegkundige u in de gaten houdt. Na de sedatie mag u direct weer gaan drinken en eten. De behandeling kan in dagopname plaatsvinden. Als het nodig is kan afgesproken worden om één nacht in het ziekenhuis te blijven ter observatie.

Het beste resultaat is een dag na de behandeling te beoordelen. De verwachting is een pijnvermindering van ca. 50% waardoor de behoefte aan

pijnmedicatie (en de eventuele bijwerkingen daarvan) verminderd kan worden.

Complicaties

Er bestaat een kleine kans op het optreden van complicaties door de coeliacus blokkade.

- Soms treedt er een bloeddrukdaling op. Die is goed te behandelen.
- In de eerste weken na de behandeling kunt u last hebben van diarree en kunt u wat duizelig worden als u plotseling rechtop komt.
- Er kan een blauwe plek ontstaan op de plaats waar geprikt is.
- U kunt koorts krijgen.
- U kunt een allergische reactie krijgen op de gebruikte medicatie.
- Na de behandeling kan er napijn optreden. Deze napijn kan enkele weken aanhouden, maar verdwijnt weer vanzelf. U kunt hiervoor pijnmedicatie innemen.
- Er is een erg kleine kans dat u kortdurend bruin gekleurde urine heeft, dan is mogelijk de nier aangeprikt.
- Er is een erg kleine kans op een klaplong. U herkent een klaplong aan hoesten, pijn op de borst en/of kortademigheid. Dit kan enkele uren na de behandeling optreden.
- In uiterst zeldzame gevallen kan er een dwarslaesie met gedeeltelijke of gehele verlamming van beide benen optreden.
- Soms kan misselijkheid zich voordoen als bijwerking van de verschillende geneesmiddelen tijdens de sedatie. We proberen dit zo veel mogelijk te voorkomen.
- De uren na de behandeling kunt u zich nog slaperig voelen.

In geval van hoesten/pijn op de borst/ kortademigheid, gevoelloosheid/uitval van de benen, koorts of een allergische reactie, dient u direct contact op te nemen met de pijnconsulent/pijnspecialist.

U mag na de behandeling niet alleen naar huis en geen voertuig besturen. Alleen met het openbaar vervoer reizen raden wij af. Wij adviseren u dat er de eerste 24 uur iemand in uw nabijheid is.

Controleafspraak

Na een week krijgt u een telefonische controleafspraak. Het afsprakenkaartje krijgt u direct na de behandeling mee.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder vragen over de pijnbehandeling? Stel deze vragen gerust aan de pijnspecialist of de pijnconsulent.

Spreekuur pijnconsulenten

De pijnconsulenten hebben op werkdagen van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 10.00 uur een telefonisch spreekuur. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer (0182) 50 51 06. U kunt altijd bellen voor vragen en advies.

Maken en wijzigen van afspraken

Voor het maken van afspraken (en eventueel het wijzigen daarvan) kunt u op werkdagen bellen met het secretariaat van de Pijnpoli (0182) 50 50 07 tussen 8.00 en 16.00 uur.

Meer informatie

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u terecht op onze internetsite: www.ghz.nl.

Adres

Groene Hart Ziekenhuis, locatie Gouda
Bleulandweg 10
2803HH Gouda

Contact

Algemene telefoonnummer ziekenhuis:
(0182) 50 50 50

Colofon

uitgave : Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
productie : Marketing & Communicatie
november 2024
04.01.034