

Tetanusvaccinatie

Op de Spoedeisende Hulp is vastgesteld dat u een (kleine) open wond heeft. In deze folder krijgt u informatie over de werkwijze rondom tetanusvaccinaties.

Wat is tetanus?

Tetanus is een ernstige ziekte gekenmerkt door hevige spierkrampen. Deze ziekte wordt veroorzaakt door de tetanusbacterie (*Clostridium tetani*). Deze bacterie is aanwezig in het darmstelsel van veel dieren en in straatvuil. Besmetting met deze bacterie kan plaatsvinden wanneer een (kleine) open wond in aanraking komt met aarde, straatvuil of mest.

Na besmetting met de tetanusbacterie duurt het gemiddeld 10 dagen voordat de ziekte zich openbaart.

Waarom inenten tegen tetanus?

Mensen zijn van nature niet tegen tetanus beschermd, waardoor mensen een vaccinatie nodig hebben. Deze vaccinatie (DKTP-prik) wordt gegeven in het Rijksvaccinatieschema. De personen die dit vaccinatieschema hebben doorlopen zijn tot hun 19e levensjaar beschermd tegen tetanus.

Wanneer tetanusvaccinatie?

U heeft het Rijksvaccinatieschema doorlopen, maar u bent langer dan 10 jaar geleden gevaccineerd tegen tetanus:

U bent onvoldoende beschermd tegen tetanus. U krijgt daarom het volgende vaccin toegediend:

- Een injectie met tetanusvaccin. Uw lichaam maakt door deze vaccinatie zelf antistoffen tegen tetanus.

Datum vaccinatie: _____

Wij raden u aan voor een blijvende bescherming binnen 10 jaar een herhalingsinjectie te vragen bij uw huisarts.

U bent nooit gevaccineerd tegen tetanus of het is u niet bekend:

U bent niet beschermd tegen tetanus. U krijgt daarom de volgende vaccins toegediend:

- Een injectie met tetanusvaccin. Uw lichaam maakt door deze vaccinatie zelf antistoffen tegen tetanus.
- Een injectie met antistoffen (immunoglobulinen). Deze injectie beschermd u direct tegen tetanus.

Voor een goede bescherming is het noodzakelijk het tetanusvaccin nog tweemaal te herhalen.

Hiervoor krijgt u een recept mee naar huis, zodat u de vaccinatie bij de huisarts kunt halen.

Noteer hier de data waarop u de injectie moet krijgen.

1^e vaccinatie: direct na de verwonding

2^e vaccinatie: 1 maand na de verwonding

3^e vaccinatie: 7 maanden na de verwonding

	Datum
1e vaccinatie + injectie met antistoffen	
2e vaccinatie	
3e vaccinatie	

Bijwerkingen

Na de injectie kunt u last krijgen van een pijnlijke gevoelige of rode plek op de plaats van de injectie. Dit is een normale tijdelijke reactie. U kunt ook wat temperatuursverhoging krijgen. Hiertegen kunt u een paracetamol innemen.

Bij langdurig aanhouden van deze klachten, kunt u contact opnemen met de huisarts.

Meer informatie

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u terecht op onze website: www.ghz.nl.
U kunt ook bellen naar het algemene informatienummer: (0182) 505050.

Colofon

uitgave : Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
productie : Marketing & Communicatie
januari 2020
08.02.028