

Littekencorrectie

Wat is littekenvorming?

Bij beschadiging van de huid van het menselijk lichaam als gevolg van een ongeval, brandwond of een operatie ontstaat littekenvorming.

Littekens kunnen dik (hypertrofisch) worden of zelfs buiten de grenzen van het oorspronkelijke litteken gaan groeien (keloïd). Deze overmatige littekenvorming komt vooral voor bij mensen met een donkere huidskleur of juist met een heel lichte huid (rossige haarkleur).

Op bepaalde lichaamsdelen zoals bijvoorbeeld schouders en borstbeen is de kans op overmatige littekenvorming groter dan ergens anders op het lichaam. Een andere factor die een litteken kan beïnvloeden, is de richting van het litteken ten opzichte van de huidspanningslijnen. In het gezicht kan men deze huidspanningslijnen duidelijk zien bij het aanspannen van de gelaatsspieren.

Een litteken dat met de huidspanningslijnen 'meeloopt', kan meer zichtbaar zijn dan een litteken dat haaks op deze lijnen staat.

Verder zal het duidelijk zijn dat een wond die is gemaakt door een scherp voorwerp, 'mooiere' littekens geeft dan een rafelige wond. Ook geeft spanning op de wond vaker een breed litteken. Vooral jonge mensen en kinderen hebben door de hogere huidspanning meer kans op overmatige littekenvorming dan oudere mensen.

Behalve chirurgische littekencorrectie bestaan er ook andere methoden om dikkere littekens te behandelen, zoals bijvoorbeeld injecties met medicijnen (corticosteroiden), druktherapie, siliconenfilm of bestraling. Bij deze behandelingen kunnen de klachten van een dik litteken verminderen, maar over het

algemeen hebben zij geen invloed op de grootte van een litteken.

De operatie

Bij een littekencorrectie wordt de vorm van littekens verbeterd. Ook al wordt een littekencorrectie met de grootste zorg uitgevoerd, het uiteindelijk resultaat kan niet worden gegarandeerd. Na een littekencorrectie moet u er rekening mee houden dat de littekens langere tijd dik, rood, jeukend en zelfs pijnlijk kunnen zijn. Sommige littekens kunnen op den duur toch breder worden dan verwacht of gehoopt. Het is goed te beseffen dat een littekencorrectie een litteken minder opvallend maakt, maar dat het litteken nooit geheel zal verdwijnen.

Complicaties

Uit bovenstaande kunt u geen garantie ontlenen als het om het resultaat gaat. Plastische en reconstructieve chirurgie is géén exacte wetenschap. Garantie op de resultaten of op het uitblijven van complicaties kunnen wij u nooit geven. Complicaties kunnen altijd optreden. Absolute symmetrie bij dubbelzijdige operaties (dus dat beide kanten er hetzelfde uitzien) is niet te garanderen. Soms is het noodzakelijk om een aanvullende operatie uit te voeren voor een goed eindresultaat. Deze aanvullende operatie kan extra kosten met zich meebrengen die door uw verzekering worden vergoed of door u zelf moeten worden betaald.

Bij complicaties thuis

Als zich thuis complicaties voordoen, kunt u contact opnemen met uw behandelend specialist, via de polikliniek assistent Plastische Chirurgie, telefoon: (0182) 50 58 78 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag)

van 8.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur).

Buiten de openingstijden van de polikliniek en bij acute problemen kunt u ook bellen met de Spoedeisende Hulp, (0182) 50 53 27.

Algemene informatie over het GHZ

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u terecht op onze website: www.ghz.nl.

Ook kunt u bellen naar het algemene informatienummer (0182) 50 50 50.

Wij wensen u een voorspoedig herstel toe.

Colofon

uitgave : Groene Hart Ziekenhuis, Gouda

productie : Marketing & Communicatie

augustus 2024

04.04.034