

Strabismus-operaties

Inleiding

In overleg met u is besloten om u of uw kind (=de patiënt) op de wachtlijst te plaatsen voor een scheelziensoperatie (of strabismusoperatie). Deze folder geeft u informatie over de gang van zaken rond de operatie.

De operatie vindt plaats op de afdeling Dagbehandeling, dit betekent dat de patiënt een paar uur na de operatie weer naar huis gaat.

Voor de operatie wordt een afspraak gepland waarbij de orthoptist samen met de oogarts definitief zal bepalen welke oogspieren geopereerd zullen worden. U ontvangt via MijnGHZ een online vragenlijst. Heeft u nog geen account aangemaakt voor MijnGHZ? Doe dit dan snel en eenvoudig door in te loggen met uw DigiD. Aan de hand van uw antwoorden kan de anesthesist u bellen en wordt er mogelijk een afspraak gemaakt voor een bezoek aan het het preoperatieve anesthesie-spreekuur.

De narcose

Een scheelziensoperatie gebeurt altijd onder algehele narcose. De narcose-arts (anesthesioloog) vertelt u vanaf welk tijdstip de patiënt niets meer mag eten en drinken. Het is belangrijk dat de patiënt nuchter is. (meer hierover leest u in de folder Dagbehandelcentrum of Kinderdagbehandelcentrum.)


Op de dag van de operatie mag de patiënt ook niet verkouden zijn of koorts hebben. Als hier sprake van is, dient u dit tijdig door te geven aan de verpleegafdeling. De operatie wordt in dat geval misschien uitgesteld.

Voor een kind is het prettig om een knuffel of iets dergelijks mee te nemen.

De operatie

Een scheelziensoperatie is een operatie aan de oogspieren van één of beide ogen. Het doel van de operatie is de oogstand te corrigeren, zodat de ogen rechter komen te staan. De reden voor deze operatie is meestal om de samenwerking tussen de ogen te verbeteren, maar kan ook cosmetisch zijn.

Ieder oog heeft zes oogspieren, die voor de bewegingen van het oog zorgen. Deze oogspieren zitten aan de buitenkant van het oog onder het bindvlies vast. Tijdens de operatie wordt het bindvlies, wat op de oogbol zit, losgemaakt. Daarna wordt de spier verplaatst of ingekort om een verzwakkend of versterkend effect van de spier te bereiken. Er worden hechtingen gebruikt om de oogspier weer aan de oogbol vast te maken en om het bindvlies te sluiten. Deze hechtingen lossen vanzelf op. Dit kan meerdere weken duren.



In de meeste gevallen heeft de operatie voldoende resultaat, echter in sommige gevallen is een tweede operatie nodig.

De operatie duurt 30-60 minuten. Na de operatie wordt er zalf in de ogen gedaan, het oog wordt niet afgeplakt.

Na de operatie

Het oog is na de operatie rood op de plaats van de geopereerde spier. Deze roodheid houdt meerdere weken aan. Het oog voelt vaak pijnlijk en beurs aan en het kan moeilijk zijn het oog open te houden. Door de narcose kan de patiënt ook wat misselijk zijn.

Omdat er door de operatie een klein wondje is ontstaan op het oog, mag de patiënt de eerste twee weken niet zwemmen en moet de patiënt voorzichtig zijn met zand (laat uw kind niet in de zandbak spelen), stof en haren wassen. Bovendien mag de patiënt niet in de ogen wrijven.

Doordat de oogstand is veranderd na de operatie, kan er een periode van dubbelzien optreden, dit verdwijnt vaak vanzelf. Het definitieve resultaat van de operatie is pas na een paar maanden te beoordelen.

Wij adviseren u een aantal dagen vrij te plannen. Indien de klachten het toelaten is het voor de ogen niet bezwaarlijk om aan het werk of naar school te gaan.

Na de operatie wordt de patiënt nog een paar keer op het spreekuur verwacht voor controle. De stand van de ogen wordt dan bekeken en er worden afspraken gemaakt over afplakken, oefeningen en oogdruppels. Tot de eerste afspraak hoeft een kind in ieder geval niet af te plakken.

Mogelijke complicaties

Net als bij elke operatie kunnen ook bij een strabismusoperatie complicaties optreden.

Er kan sprake zijn van een over- of ondercorrectie. De oogstand is dan (nog) niet goed gecorrigeerd. Bij de controle na

een paar maanden kan bekenen worden of een heroperatie nodig is.

Heel soms komt het voor dat bij het ophechten van de spier de naald te diep wordt gestoken. Dit heeft zelden consequenties.

Zelden komt een nabloeding of een infectie voor. Indien er een toename van de roodheid is of een pussige afscheiding adviseren wij contact met ons op te nemen.

Medicatie

U heeft een recept voor druppels of zalf meegekregen, gebruik deze volgens het afgesproken schema.

Indien de patiënt pijn ervaart na de operatie kan hier paracetamol voor worden ingenomen.

Algemene informatie over het GHZ

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u terecht op www.ghz.nl. Ook kunt u dagelijks bellen naar het algemene informatienummer: (0182) 50 50 50.

Vragen?

Deze folder is met grote zorgvuldigheid ontwikkeld. Toch kunnen we niet helemaal volledig zijn. En een folder kan een gesprek met uw oogarts niet vervangen.

Heeft u na het lezen van deze folder vragen over de strabismusoperatie, dan kunt u altijd terecht bij uw oogarts of orthoptist. U kunt bellen met: (0182) 50 50 14.

Voor een actueel overzicht van het behandelteam van de Oogheelkunde, kunt u terecht op www.ghz.nl/oogheelkunde.

Colofon

uitgave: Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
productie: Marketing & Communicatie
september 2025
04.11.052