

Overactieve blaas Behandeling met botoxinjecties

Uw blaas is overactief. De uroloog gaat u behandelen met botoxinjecties. In deze folder leest u:

- Hoe u zich voorbereidt;
- Hoe de behandeling gaat;
- Wat het resultaat is.

Zo bereidt u zich goed voor

Lever een urinekweek in

Dit doet u als u een verblijfskatheter heeft. Of als u aan zelfkatheterisatie doet. Lever de kweek 2 weken vóór uw behandeling in. Zo kunnen wij onderzoeken of u een urineweginfectie heeft.

Lever een urinesediment in

Dit doet u als u geen katheter heeft of gebruikt, maar wél pijn of een branderig gevoel heeft als u plast. Of als u 2 weken vóór uw afspraak koorts heeft.

Slik antibiotica

2 uur vóór uw behandeling slikt u antibiotica. Zo voorkomt u een infectie. Voor de antibiotica krijgt u van ons een recept.

Meld bloedverdunners

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Meld dit dan vóór de behandeling bij uw uroloog. In overleg met uw arts stopt u deze medicijnen ruim voor uw behandeling.

Eet en drink zoals u gewend bent

U mag gewoon eten en drinken zoals u normaal doet.

Behandeling

De behandeling bestaat uit 6 stappen:

1. *U krijgt tijdelijk een katheter*
15 tot 30 minuten vóór uw behandeling krijgt u een katheter. Zo krijgt u een verdovende vloeistof in uw blaas (lidocaïne). De katheter halen we direct weer weg.
2. *U gaat weer naar de wachtkamer*
Probeer tot uw behandeling niet te plassen (en te drinken). Zo blijft de verdoving in uw blaas.
3. *U wordt opgehaald*
De verpleegkundige brengt u naar de behandelkamer. Hier kunt u uw kleding van uw onderlichaam uitdoen. De rest mag u aanhouden.
4. *U gaat plassen*
Vóór uw behandeling moet u eerst plassen. Bent u een man? Dan maken we de blaas leeg en verwijderen we de katheter.
5. *U krijgt een kijkbuisje*
De uroloog brengt via uw plasbuis een kijkbuisje in uw blaas (cystoscoop).
6. *De uroloog spuit botox in*
U krijgt op zo'n 10 plekken in de blaasspier een beetje botox. Dit duurt ongeveer 10 minuten.

Na de behandeling

U kleedt zich weer aan. Uw arts bespreekt de verdere behandeling met u.

- *Rijd géén auto*
Na de ingreep mag u zelf niet autorijden. Zorg vooraf voor vervoer naar huis.
- *Drink water*
Drink na de behandeling minimaal 2 liter vocht. Er kan wat bloed in uw urine zitten. Dan is het goed om nog wat meer te drinken.

Resultaat

Het resultaat van de behandeling verschilt per persoon. Meestal merkt u het na 3 tot 21 dagen. U voelt dan minder aandrang om te plassen. Ook hoeft u minder vaak te plassen. De injecties werken gemiddeld 6 maanden. Is het effect weg? Dan kunnen we de behandeling herhalen.

Mogelijke risico's

Na de behandeling heeft u meer kans op een urineweginfectie. Bij zo'n 7 procent van de patiënten werkt de botox zo goed, dat de blaas niet meer helemaal samentrekt. Hierdoor blijft er urine achter in de blaas. Dan moet u uw blaas zelf leegmaken door zelfkatheterisatie.

Is de botox uitgewerkt? Dan kunt u uw blaas gewoon weer leeg plassen.

Is zelfkatheterisatie nodig? Dan leren wij dat u op de polikliniek Urologie.

Complicaties

Bel de polikliniek Urologie als u:

- Niet meer kunt plassen;
- Een blaasontsteking krijgt;
- Na een week nog bloed(stolsel) in uw urine zit en niet vermindert;
- Hevig brandende pijn voelt bij het plassen;
- Koorts heeft (boven 38,5 graden Celsius).

Heeft u nog vragen?

Stel deze dan aan uw arts of verpleegkundige. Bent u niet meer in ons ziekenhuis? Bel dan gerust naar de polikliniek Urologie: (0182) 50 55 70 van 9.00 tot 10.00 uur en van 14.00 tot 15.00 uur. Spoed? Bel dan (0182) 50 50 50.

Algemene informatie

Voor informatie over het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) kijkt u op www.ghz.nl.

Groene Hart Ziekenhuis, Locatie Gouda

Bleulandweg 10
2803 HH Gouda

Algemeen telefoonnummer ziekenhuis:
(0182) 50 50 50

Colofon

uitgave : Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
productie : Marketing & Communicatie
december 2023
04.20.085