

Blaastumor wegbranden met stroom

Poliklinische behandeling van oppervlakkige blaastumoren

Poliklinische behandeling

U heeft een afwijking in uw blaas die we moeten behandelen. De uroloog brandt kleine tumoren in uw blaas weg met een kleine sonde. Deze behandeling kan met een plaatselijke verdoving poliklinisch plaatsvinden, dus u hoeft niet in het ziekenhuis te blijven. De behandeling is vooral geschikt voor nieuwe tumoren in de blaas die al eerder zijn behandeld. In de meeste gevallen hoeven we geen weefselonderzoek te doen.

Wat moet u doen voor de behandeling?

U hoeft thuis niets speciaals te doen voor uw behandeling.

Medicijnen

Gebruikt u medicijnen die uw bloed dunner maken? Vertel dit dan aan uw uroloog. Het kan zijn dat u hiermee voor de operatie tijdelijk moet stoppen.

De behandeling

Soms krijgt u een half uur voor de behandeling een verdovende vloeistof in de blaas.

Met de cystoscoop (een inwendige camera) en een dunne coagulatiesonde wordt de afwijking weggebrand ook kunnen er eventueel bipten afgenomen worden.

Na de behandeling

De arts spreekt met u af of u na de behandeling nog direct een blaasspoeling (Mitomycine) krijgt. Het is belangrijk om veel te drinken. Zo spoelt u uw blaas goed door.

Een paar adviezen

- Drink veel water, ongeveer 1,5 tot 2 liter per dag. Zo verdunt u het bloed in uw urine;
- Pers niet te hard als u poept. Dit kan de bloeding verergeren;
- Als uw poep hard is, kunt u deze zachter maken met medicijnen.

Controle bij de uroloog

U krijgt een controle afspraak bij uw uroloog om te kijken hoe het met u gaat en eventueel de uitslag van het biopt te bespreken. Deze onderzoekt u om te zien of alles goed is. De datum van de afspraak spreken we nog met u af.

Klachten na de behandeling

Na uw behandeling kan het zijn dat u wat pijn voelt tijdens of na het plassen. Dit komt door het wondje in uw blaas. Ook kunt u vaker het gevoel hebben om te moeten plassen. Soms ziet u bloed of vlokjes in uw urine. Deze klachten gaan meestal binnen een paar dagen over.

Bel het ziekenhuis als binnen 2 weken na uw behandeling:

- U grote bloedstolsels plast en daardoor niet goed kunt plassen;
- Het bloedverlies via uw urine niet minder wordt;
- U koorts boven de 38,5 graden krijgt;
- Uw irritatieklachten van de blaas toenemen, bijvoorbeeld ernstige brandende pijn tijdens het plassen;
- U niet meer kunt plassen.

Heeft u nog vragen?

Belt u ons dan gerust via telefoonnr.
(0182) 50 55 70 van 9.00 uur tot 10.00 uur en
van 14.00 uur tot 15.00 uur. Voor spoed kunt u
ons bereiken via het centrale
telefoonnummer: (0182) 50 50 50.

Algemene informatie over het GHZ

Voor informatie over het ziekenhuis kijkt u op
www.ghz.nl. Of bel naar (0182) 50 50 50.

Groene Hart Ziekenhuis, Locatie Gouda

Bleulandweg 10
2803 HH Gouda

Algemeen telefoonnummer ziekenhuis:
(0182) 50 50 50

Colofon

uitgave : Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
productie: Marketing & Communicatie
december 2025
04.20.088