

Zoledroninezuur (Zometa/Aclasta) of APD

Inleiding

Uw behandelend arts heeft u voorgesteld te starten met een botversterkend middel. De behandeling is erop gericht de botsterkte te verbeteren en kans op botbreuken te verminderen.

Zoledroninezuur (Zometa/Aclasta)

Het medicijn 'zoledroninezuur' wordt door middel van een infuus toegediend. De arts bespreekt met u hoe vaak en hoelang deze behandeling zal duren. Als uw behandelend arts uw gezondheidstoestand stabiel vindt, kan dit geneesmiddel ook bij u thuis worden toegediend.

De totale duur is van de behandeling is een uur, waarbij het aansluiten van het infuus en het spoelen voor en na de behandeling is meegerekend. De duur van de behandeling zelf is vijftien minuten.

APD

Het medicijn APD wordt door middel van een infuus toegediend. De arts bespreekt met u hoe vaak en hoelang deze behandeling zal duren. Dit geneesmiddel kan niet bij u thuis worden toegediend. Een korte ziekenhuisopname is daarom noodzakelijk.

De duur van de behandeling is afhankelijk van de dosering van de APD. In de meeste gevallen duurt de behandeling een tot twee uur.

De behandeling met zoledroninezuur of APD wordt over het algemeen goed verdragen.

Vorbereiding

- Voorafgaand aan het starten van deze medicatie, zullen de nierfunctie en het calciumgehalte via een

bloedonderzoek worden

gecontroleerd. Uw behandelend arts bekijkt uw bloeduitslagen. Gedurende de behandeling zal met regelmaat uw bloed gecontroleerd worden.

- Uw behandelend arts kan u vragen een gebitscontrole bij de tandarts te ondergaan. Via bijgevoegd formulier informeert u uw tandarts over welk botversterkend middel u krijgt. Uw tandarts controleert dan de kwaliteit van uw kaakbot en bekijkt of er nog gesaneerd moet worden voordat u start met het botversterkende medicijn.

Om de kans op botbeschadiging van de kaak zo klein mogelijk te maken, is het belangrijk dat u zorgt voor een goede gebitshygiëne:

- Poets uw tanden en tong na elke maaltijd en voor het slapen gaan.
- Spoel de mond goed na. Poets met een zachte borstel. Houd uw mond goed vochtig, door regelmatig wat te drinken.
- Laat uw gebit elk half jaar controleren bij de tandarts.
- Als u een kunstgebit draagt: zorg dat deze goed past.

De behandeling

Op de dag van de behandeling hoeft u niet nuchter te zijn en mag u uw gebruikelijke medicatie die dag gewoon innemen. Zorg ervoor dat u voldoende drinkt (tenminste een of twee glazen voor en na de behandeling). U meldt zich op de afgesproken datum en tijd bij de behandelkamer.

De verpleegkundige geeft u informatie over de gang van zaken en begeleidt u tijdens de behandeling.

Er wordt een infuusnaaldje ingebracht door de verpleegkundige, waarna het infuus met zoledroninezuur of APD wordt aangesloten.

Zodra de behandeling klaar is, wordt het infuusnaaldje verwijderd en kunt u weer naar huis.

Mogelijke bijwerkingen

Bijwerkingen gerelateerd aan de eerste infusie komen bij meer dan dertig procent van de patiënten voor. Zij komen minder vaak voor na de daarop volgende infusies. Soms kan na de toediening van zoledroninezuur of APD tijdelijk sprake zijn van:

- Spierpijn;
- Koorts;
- Hoofdpijn;
- Maag-en darmklachten of het gevoel van algehele malaise.

Deze klachten ontstaan meestal binnen 24 uur en verdwijnen veelal binnen 48 uur. U kunt hiervoor zo nodig paracetamol gebruiken. Maximaal vier keer daags twee tabletten (1000 mg).

Let op!

- Neem bij (aanhoudende) klachten contact op met uw casemanager, via: (0182) 50 55 28.
- Neem bij acute klachten – ook als deze zich 's avonds en/of 's nachts voordoen – altijd contact op met een medewerker van de afdeling Oncologie, via: (0182) 39 36 55.
- Bij een levensbedreigende situatie kunt u ook contact opnemen met de spoedeisende hulp (SEH), via: 112.

Neem daarnaast altijd contact op als u last krijgt van de volgende klachten:

- Pijn in de mond, aan de tanden en/of aan de kaak;
- Zwelling of niet genezende, pijnlijke plekken in de mond of kaak;
- Infecties in de mond;
- Een verdoofd of zwaar of ongewoon gevoel in de kaak of aan de tanden of kiezen;
- Het los gaan zitten van een tand.

Mogelijke klachten na langdurig gebruik, dus na meerdere infusies:

- Kaakerosie; beschadigingen aan kaak en daardoor problemen met gebit.

Beïnvloedt dit geneesmiddel de rijvaardigheid?

Zoledroninezuur en APD hebben geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. Als u zich duizelig voelt wanneer u dit geneesmiddel neemt, rijd dan niet of bedien geen machines totdat u zich beter voelt.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van de informatie in deze folder, dan kunt u contact opnemen met de oncologieverpleegkundige/ eigen casemanager, via: (0182)505066 of 505975. Deze is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Algemene informatie over het GHZ

Voor informatie over het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) kunt terecht op onze internetsite: www.ghz.nl. Ook kunt u bellen naar het algemene informatienummer (0182) 50 50 50.

Adres

Groene Hart Ziekenhuis, locatie Gouda
Bleulandweg 10
2803 HH Gouda

Contact

Algemeen telefoonnummer ziekenhuis:
(0182) 50 50 50.

Colofon

uitgave: Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
productie: Marketing & Communicatie
november 2020
04.07.121

Geachte tandarts,

Uw cliënt wordt gezien op de polikliniek Interne Geneeskunde/Oncologie van het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) en wordt behandeld met een bisfosfonaat. Dit kan zijn Denosumab, Zometa, Aclasta of APD.

Graag uw aandacht hiervoor bij eventuele tandheelkundige ingrepen.

De voorgeschreven medicatie is momenteel:

- een oraal bisfosfonaat 1 keer per week, gestart per ...
- denosumab injectie 60 mg subcutaan 1 keer per ... maanden, gestart per ...
- zoledroninezuur mg (Aclasta/Zometa) intraveneus ... keer per jaar, gestart per ...
- pamidroninezuur mg (APD) intraveneus ...dag(en) per 3 maanden, gestart per ...

Voor eventuele vragen over de medicatie of voor overleg met betrekking tot de geplande ingreep, kunt u contact opnemen met het secretariaat, via telefoonnummer: (0182) 50 50 05.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
namens het behandelteam van Interne Geneeskunde/Oncologie