


Plaatsen katheter in bovenarm (PICC)

Inleiding

Uw behandelend arts heeft besloten dat u een behandeling nodig heeft waarbij een bloedvat continu of met tussenpozen moet worden aangeprikt. Daarom wordt binnenkort bij u een Perifeer Ingebrachte Centraal veneuze Katheter (PICC) ingebracht. Dit is een dun flexibel slangetje (katheter) dat in de bovenarm in een bloedvat wordt ingebracht. Deze folder geeft informatie over de PICC, de ingreep en de toepassing. Als u na het lezen nog vragen heeft, stel die dan gerust aan de arts of de verpleegkundige.

Wat is een PICC?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een bloedvat in de arm zelf niet veelvuldig aangeprikt kan worden. Een veel voorkomende reden is dat door de te geven vloeistof het bloedvat beschadigd raakt. Daarom wordt bij u een PICC ingebracht. PICC is een Engelse afkorting voor Peripherally Inserted Central Katheter. Dit is dus een dun slangetje (katheter) dat in de bovenarm in een bloedvat wordt ingebracht. De katheter wordt opgeschoven tot net boven het hart. Het overige deel wordt op uw bovenarm vastgeplakt met een speciale pleister.



Waarom een PICC?


De geneesmiddelen worden via het afsluitdopje in de katheter ingebracht. Ze komen dan in een groot bloedvat terecht en worden daardoor snel verdund. Zo wordt schade aan het bloedvat voorkomen. De PICC is speciaal ontworpen om het geven van medicijnen en het afnemen van bloed makkelijker te maken. Een PICC is geschikt voor een langdurige infuusbehandeling.

Medicijnen

Als u antistollingmedicijnen gebruikt moet u dit melden bij de arts. De INR-waarde in uw bloed mag tijdens het inbrengen van de katheter namelijk niet hoger zijn dan 2.5.

Het inbrengen van de PICC

Dit vindt plaats op de afdeling Radiologie (route 70). U meldt zich daar op de afgesproken datum en tijd. De radioloog zoekt vervolgens met een echoapparaat een geschikt bloedvat om de PICC in de bovenarm in te brengen. Met behulp van röntgenlicht schuift de radioloog de PICC naar de juiste plek. De plaats waar geprikt wordt, zal plaatselijk worden verdoofd. Het inbrengen duurt ongeveer 30 minuten. De katheter wordt met een speciale pleister (statlock) op de arm vastgezet. Het geheel wordt afgedekt met een doorzichtige pleister. De meeste patiënten ervaren het inbrengen niet als belastend of pijnlijk.



De volgende dag moet de insteekopening worden gecontroleerd en de pleister eventueel worden verschoond. Hiervoor krijgt u een afspraak in het Behandelcentrum Oncologie & Hematologie (BOH afdeling, B4).

Verzorging

Eén keer per week moet de PICC door een verpleegkundige worden verzorgd. De pleisters worden verschoond en het afsluitdopje vernieuwd. Ook moet de katheter worden doorgespoten met een zoutoplossing om stolsels te voorkomen. De verzorging van de PICC kan worden gedaan in het Behandelcentrum Oncologie & Hematologie (BOH afdeling, B4, route 62) of door het Team Thuiszorgtechnologie Midden Holland van de Vierstroom.

PICC thuis

De insteekopening mag niet nat worden. Als u wilt douchen moet u de bovenarm afdekken met een plastic zak, plastic folie of een speciaal daarvoor bestemde hoes. Baden, zwemmen en saunabezoek worden afgeraden in verband met het risico op infectie.

Als de insteekplaats onder de folie bij het douchen of om een andere reden vochtig is geworden, moet deze opnieuw worden verzorgd.

Complicaties

Het is verstandig de aanprikplaats regelmatig te controleren. Neem direct contact op met arts of verpleegkundige:

- Bij een (mogelijke) infectie ter hoogte van de insteekplaats of van de bovenarm. Bijvoorbeeld bij roodheid, zwelling, warmte, irritatie, pijn. Als uw arm dikker en pijnlijk is aan de kant van de PICC. Dit kan wijzen op een trombose (stolsel in uw bloed).

- Bij lekkage van vocht en bloed naast de PICC. Het gaat dan om zowel de lijn als het afsluitdopje.
- Bij kortademigheid, hoesten of pijn rond de borstkas.
- Bij koorts en/of koude rillingen.

Belangrijk:

- Het meten van de bloeddruk aan de arm met de katheter is verboden.
- Bloedafname kan plaatsvinden door de PICC of anders bij voorkeur uit de andere arm.
- Bloedonderzoek via een vingerprik aan de kant van de PICC is geen probleem.
- Een PICC kan gebruikt worden voor het inspuiten van contrastvloeistof, bijvoorbeeld bij een CT-scan.

Algemene informatie over het GHZ

Voor algemene informatie over het ziekenhuis kunt u terecht op de website van Het Groene Hart Ziekenhuis: www.ghz.nl.

U kunt ook bellen naar het algemene informatienummer: (0182) 50 50 50.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder vragen over de PICC? Neem dan gerust (het liefst tijdens kantooruren) contact op met het Behandelcentrum Oncologie & Hematologie: (0182) 50 54 21.

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de afdeling Interne Geneeskunde/C5: (0182) 50 59 89.

Groene Hart Ziekenhuis, Locatie Gouda

Bleulandweg 10
2803 HH Gouda

Algemeen telefoonnummer ziekenhuis:
(0182) 50 50 50

Colofon

uitgave: Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
productie: Marketing & Communicatie
juli 2022
04.07.092