

Sedatie bij een endoscopisch onderzoek

Inleiding

Uw huisarts of specialist heeft voor u een onderzoek onder lichte sedatie aangevraagd. Bij lichte sedatie wordt een rustgevend middel toegediend.

Deze informatie is een aanvulling op het gesprek dat u heeft gehad met uw huisarts, de specialist of de MDL-verpleegkundige.

Sedatie

Het rustgevend middel (Midazolam) werkt snel en kortdurend. Het zorgt ervoor dat u soezerig/slaperig wordt en meer ontspannen bent tijdens het onderzoek. U kunt echter nog wel reageren op aanwijzingen die de arts of de verpleegkundige geven. Het rustgevend middel is dus geen narcose.

Hoe wordt het rustgevend middel gegeven?

U krijgt het rustgevend middel via uw bloedvat. De arts of endoscopie verpleegkundige prikt een infuusnaaldje in uw bloedvat. Dit is meestal het bloedvat aan de binnenkant van uw elleboog. Zodra het naaldje in uw bloedvat zit, blijft er een plastic buisje achter. Via dit buisje krijgt u het rustgevend middel.

Wat kunt u van het rustgevend middel verwachten?

U kunt op verschillende manieren op het rustgevend middel reageren. Waarschijnlijk bent u slaperig (half wakker), maakt u bewust delen van het onderzoek mee, maar ervaart u het onderzoek niet als belastend. Het kan

ook gebeuren dat u slaapt en niets van het onderzoek merkt.

Belangrijk: het effect van het rustgevend middel is minder bij het gebruik van slaapmedicatie, rustgevend medicatie en bij frequent alcohol- en/of drugsgebruik. Gebruik daarom twaalf uur voor tot twaalf uur na het onderzoek geen alcohol en gebruik slaapmedicatie alleen in overleg met de arts.

Bijwerkingen

Uw zuurstofgehalte kan als gevolg van de het rustgevend middel dalen. U krijgt zo nodig extra zuurstof via een zuurstofslangetje in uw neusgaten.

U kunt na het onderzoek (ook) last krijgen van slaperigheid, duizeligheid, vermoeidheid, hoofdpijn of vergeetachtigheid. U kunt daarnaast moeite hebben met de concentratie. Uw reactievermogen is sterk verminderd zonder dat u dit zelf merkt.

Na het onderzoek

U blijft na het onderzoek nog één uur op de Scopie afdeling om uit te slapen. Wij blijven uw hartslag, bloeddruk en zuurstofgehalte ook tijdens het uitslapen controleren. Als u goed wakker bent, krijgt u een broodmaaltijd en drinken.

Houd u er rekening mee dat u zich door het rustgevend middel de rest van de dag suf kunt voelen.

U mag daarom **tot twaalf uur** na het onderzoek niet:

- Actief deelnemen aan het verkeer;
- Alcohol drinken;
- Belangrijke beslissingen nemen;
- Gevaarlijke machines bedienen.

Belangrijk: Zorg ervoor dat een relatie ouder dan 18 jaar u na het onderzoek van de Scopie afdeling ophaalt. Als u van tevoren geen begeleiding heeft geregeld, kan het onderzoek met het rustgevend middel niet doorgaan.

Contact

Als u vragen heeft, neemt u contact op met de Scopie afdeling. Op werkdagen bereikbaar tussen 8:00 - 17:00 uur: (0182) 50 50 17.

Groene Hart Ziekenhuis, Locatie Gouda

Bleulandweg 10
2803 HH Gouda

Algemeen telefoonnummer ziekenhuis:
(0182) 50 50 50.

Colofon

uitgave: Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
productie: Marketing & Communicatie
juni 2021
05.04.081